

妊娠高血圧症候群等療養証明書

(フリガナ) 氏名		生年月日	年 月 日
(死亡の場合死亡年月日)			年 月 日
病名	妊娠高血圧症候群・糖尿病・貧血・産科出血・心疾患		
入院中の医療	1 帝王切開 (有 ・ 無) 2 分娩誘発 (有 ・ 無) 3 食事療法 (食 日間) 4 薬物療法 (使用薬剤名) 5 手術療法等 () 6 その他 ()		
入院期間	年 月 日から 年 月 日まで (日間)	証明時の妊娠 週数 (又は分 娩年月日)	妊娠 週 (分娩年月日 年 月 日)
症状等	1 妊娠高血圧腎症 ① 高血圧 (/ mmHg) (収縮期血圧: 160 mm Hg 以上・拡張期血圧: 110 mm Hg 以上) ② 蛋白尿 (/ mg/dl) (2g/day 以上・試験紙法: 3 以上・試験紙法: 300mg/dl 以上) 2 妊娠高血圧 (収縮期血圧: 160 mm Hg 以上・拡張期血圧: 110 mm Hg 以上) 3 加重型妊娠高血圧腎症 4 子癇 5 その他妊娠高血圧症候群関連疾患 (肺水腫・脳出血・早剥・HELLP症候群) 6 妊娠前から診断が確定している糖尿病の合併妊娠 7 妊娠糖尿病 (75gOGTT で空腹時血糖値: (mg/dl) 1時間値: (mg/dl) 2時間値: (mg/dl)) 8 妊娠時に診断された明らかな糖尿病 (空腹時血糖値: (mg/dl)・HbA1c: (%)・糖尿病網膜症・随時血糖値: (mg/dl)・75gOGTT で2時間値: (mg/dl)) 9 貧血 (血色素 8g/dl 以下) 10 産科出血に対する輸血等の応急処置 (有 ・ 無) 11 心疾患 (心不全・心内膜炎・心房細動等の不整脈 その他 ())		
医師の意見			
上記のとおり証明する 年 月 日 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療担当医師氏名			

(注)

- 1 入院開始後21日を経過しても退院に至らないものについては「入院期間」の最終日を21日とし、21日間の入院期間に係る証明をしてください。
- 2 「病名」については、該当する病名を○で囲んでください。
- 3 「入院中の医療」については、該当文字を○で囲み、()内には必要事項を記入してください。
- 4 「症状等」については、該当文字を○で囲み、()内には必要事項を記入してください。

さいたま市妊娠高血圧症候群等療養援助費支給対象者基準

分 類		基 準
妊 娠 高 血 圧 症 候 群	1) 妊娠高血圧腎症 *妊娠 20 週以降に初めて高血圧が発症し、かつ蛋白尿をともなうもので分娩後 12 週までに正常に復する場合をいう。	①高血圧：収縮期血圧 160 mmHg 以上または拡張期血圧 110 mm Hg 以上 ②蛋白尿：2 g/day 以上、随時尿を用いた試験紙法による成績しか得られない場合は、複数回の新鮮尿検体で、連続して 3+以上(300 mg/dl)の陽性と判定されるとき。
	2) 妊娠高血圧 *妊娠 20 週以降に初めて高血圧が発症し、分娩後 12 週までに正常に復する場合をいう。	高血圧：収縮期血圧 160 mmHg 以上または拡張期血圧 110 mm Hg 以上
	3) 加重型妊娠高血圧腎症 *(1)高血圧症 (chronic hypertension) が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し妊娠 20 週以降蛋白尿をともなう場合、(2)高血圧と蛋白尿が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降、いずれか、または両症状が増悪する場合、(3)蛋白尿のみを呈する腎疾患が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降に高血圧が発症する場合をいう。	医師の診断による。
	4) 子癇 *妊娠 20 週以降に初めて痙攣発作を起こし、てんかんや二次痙攣が否定されるもの。痙攣発作の起こった時期により、妊娠子癇、分娩子癇、産褥子癇という。	医師の診断による。
	5) 関連疾患	必ずしも妊娠中毒症に起因して発症するものではないが、かなり深い因果関係があり、また重篤な疾患。 肺水腫・脳出血・早剥・HELLP 症候群の 4 疾患を対象とする。
糖 尿 病	1) 妊娠前から診断が確定している糖尿病の合併妊娠	糖尿病の診断基準は日本糖尿病学会の診断手順による。
	2) 妊娠糖尿病	75gOGTT において次の基準の 1 点以上を満たした場合 ①空腹時血糖値 $\geq 92\text{mg/dl}$ (5.1mmol/l) ②1 時間値 $\geq 180\text{mg/dl}$ (10.0mmol/l) ③2 時間値 $\geq 153\text{mg/dl}$ (8.5mmol/l)
	3) 妊娠時に診断された明らかな糖尿病	次のいずれかを満たした場合 ①空腹時血糖値 $\geq 126\text{mg/dl}$ ②HbA1c $\geq 6.5\%$ ③確実な糖尿病網膜症が存在する場合 ④随時血糖値 $\geq 200\text{mg/dl}$ あるいは 75gOGTT で 2 時間値 $\geq 200\text{mg/dl}$ の場合 *いずれの場合も空腹時血糖か HbA1c で確認
貧 血	血色素がおおむね 8 g/dl 以下のもの。	
産 科 出 血	産科出血により出血多量で輸血その他の応急処置を必要とするもの。	
心 疾 患	先天性あるいは後天性の心疾患を有し、心不全、肺水腫、心内膜炎、心房細動等の不正脈等病態の悪化が認められるもの。	

(注)

- 1 妊娠高血圧症候群の病型分類は日本産科婦人科学会による妊娠高血圧症候群の定義・分類(2005)による。
- 2 妊娠糖尿病及び妊娠時に診断された明らかな糖尿病の基準については、日本糖尿病・妊娠学会の妊娠糖尿病診断基準による。