

事 務 連 絡
令 和 7 年 3 月 19 日

各 { 都 道 府 県
保健所設置市
特 別 区 } 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課

麻疹の国内外での報告増加に伴う注意喚起について（協力依頼）

我が国では、麻疹については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）において 5 類感染症に位置付けられており、第 12 条の規定に基づき、麻疹の患者を診断した医師は、都道府県知事等に対して直ちに届け出ることを義務付けています。

麻疹については、現在、海外における流行が報告されています。特に、ベトナムをはじめとする諸外国を推定感染地域とする輸入事例の報告が増加しており^{*1}、今後、輸入事例の更なる増加や、国内における感染伝播事例が増加することが懸念されます。

これらの状況を踏まえ、海外渡航者への注意喚起のため、別添のとおりリーフレットを作成いたしました。

つきましては、貴自治体におかれては、下記のとおり、海外渡航者や、貴自治体管内の保健所及び医療機関等に対し、注意喚起を行っていただくとともに、麻疹に関する特定感染症予防指針（平成 19 年厚生労働省告示第 442 号。以下「特定感染症予防指針」という。）に基づく対応の徹底をお願いいたします。また、麻疹の臨床診断例などの疑い例及び検査診断例の発生届受理時には、下記の連絡先を確認いただき、自治体より厚生労働省及び国立感染症研究所^{*2}への一報をお願い申し上げます。

なお、同様の事務連絡を公益社団法人日本医師会に発出していることを申し添えます。

（※ 1）感染症発生動向調査（IDWR）速報グラフ | 国立感染症研究所

<https://www.niid.go.jp/niid//images/idsc/disease/measles/2025pdf/meas25-10.pdf>

（※ 2）4 月 1 日より、国立健康危機管理研究機構（JIHS）となります。

記

第一 海外渡航者への注意喚起

海外渡航の予定がある者に対して、次の2点について注意喚起を行うこと。

1 海外渡航前の注意事項

- ・ ウェブサイト等を参考に、渡航先の麻しんの流行状況を確認すること。
- ・ 母子保健手帳などを確認し、過去の麻しんに対する予防接種歴、り患歴を確認すること。
- ・ 過去定期接種を実施した記録がない場合は、渡航前に予防接種を受けることを検討すること。
- ・ 麻しんのり患歴やワクチン接種歴が不明な場合は、抗体検査を受けることを検討すること。

2 麻しんの流行がみられる地域に渡航後の注意事項

- ・ 渡航後、帰国後2週間程度は麻しん発症の可能性も考慮して健康状態に注意すること。
- ・ 発熱や咳そう、鼻水、眼の充血、全身の発しん等の症状が見られた場合は、医療機関を受診すること。また受診時には、医療機関に対して事前に、麻しんの流行がみられる地域に渡航していたことや、麻しんの可能性について伝達すること。
- ・ 医療機関を受診する際には、医療機関の指示に従うとともに、可能な限り公共交通機関を用いることなく受診すること。

第二 自治体における対応

- 1 積極的疫学調査や検査の徹底を含め、特定感染症予防指針に基づく対応の徹底を行うこと。

- 2 保健所においては、「麻疹発生時対応ガイドライン第二版：暫定改訂版」を参考に、積極的疫学調査を実施すること。

https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/guideline02_20160603.pdf

- 3 臨床診断例などの疑い例については、特定感染症予防指針に基づき、地方衛生研究所等において、全例に対して核酸増幅法検査による確定検査を行うとともに、検査の結果、麻しんウイルスが検出された場合は、可能な限り、地方衛生研究所等において麻しんウイルスのゲノム配列の解析を実施し国に報告する又は国立感染症研究所に検体を送付すること。

- 4 麻しんの臨床診断例などの疑い例及び検査診断例の発生届受理時には、早期探知による対応等のために、以下の連絡先に、当該事例の感染症サーベイランスシステム報告 ID を送付すること。感染症サーベイランスシステム報告 ID が未付与または不明の場合は、届出保健所、年齢、性別、麻しん含有ワクチン接種歴、症状、現時点での検査状況と結果を送付すること。（メールの件名に「麻しん」と記載して厚生労働省と国立感染症研究所の両方に送付すること）
- 5 患者の行動歴等から広域にわたる麻しん事例の発生が危惧される又は実際に発生がみられる時には、国や自治体間の連携が非常に重要となることから、そのような事案の発生時においては国立感染症研究所への疫学調査支援の要請を積極的に検討すること。

【4、5の連絡先】

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課

TEL: 03-3595-2257（特定感染症係） Email: SARSOPC@mhlw.go.jp

国立感染症研究所 実地疫学研究センター

TEL: 03-5285-1111（2583） Email: outbreak@nih.go.jp

（※）4月1日以降は、国立健康危機管理研究機構 応用疫学研究センターとなる予定。

TEL: 変更なし Email: 変更なし

- 6 麻しんの予防接種は麻しんの感染予防法として最も有効な手段であるところ、令和5年度の接種実績（※）は、自治体によっては、接種率目標（95%）を下回っている。このため、各自治体におかれては、接種率目標（95%）に到達するよう、引き続き、積極的な接種勧奨に取り組むこと。
なお、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期の予防接種の実施に係る対応について」（令和2年3月19日付け厚生労働省健康局健康課事務連絡）において、新型コロナウイルス感染症に起因する事情によりやむを得ず規定の接種時期を超えて定期接種を行った者については、予防接種法施行規則（昭和23年厚生省令第36号）第2条の8第3号に該当するものと取り扱って差し支えないこととしていたが、「予防接種法施行令の一部を改正する政令等の施行について（施行通知）」（令和6年3月29日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長通知）でお示ししているとおおり、令和6年4月1日以降においては、同日以降に生じた新型コロナウイルス感染症に起因する事情により規定の接種時期内に定期接種を実施できなかった場合については、同号に該当しないため、規定の接種時期内に確実な接種に努めるようお願いしたい。

また、乾燥弱毒生麻疹風疹混合ワクチンの供給状況及び定期接種の確実な実施に係る対応について、「乾燥弱毒生麻疹風疹混合ワクチンの今後の供給見通し等について」（令和6年12月12日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課及び感染症対策課連名事務連絡）及び「麻疹及び風疹の定期の予防接種に係る対応について」（令和7年3月11日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡）等において示しているため、参考にすること。

(※) 麻疹風疹予防接種の実施状況

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/hashika.html>

第三 医療機関における対応

1 発熱や発疹を呈する患者を診察した際は、麻疹の可能性を念頭に置き、海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し、麻疹の罹患歴及び予防接種歴を確認するなど、麻疹を意識した診療を行うこと。

2 麻疹を疑った場合には、特定感染症予防指針に基づき、臨床診断をした時点で、感染症法第12条の規定に基づき、まず臨床診断例として直ちに最寄りの保健所に届出を行うこと。

3 診断においては、血清IgM抗体検査等の血清抗体価の測定を実施するとともに、地方衛生研究所等でのウイルス学的検査(※)の実施のため、保健所の求めに応じて検体を提出すること。

(※) 血清IgM抗体は、他の疾患でも交差的に陽性となることがあることから、必ずウイルス遺伝子検査を実施する必要がある。また、麻疹の疫学調査において、ウイルスのゲノム配列は極めて重要であることから、保健所は、感染症法15条の規定に基づき、診断医療機関に対し、検体の提出を求めることがある。

4 医療従事者の麻疹含有ワクチン接種歴(2回以上の接種)を確認していることが望ましい。

第四 関係資料

上記の対応等に際し、必要に応じて、下記の関係資料を活用されたい。

・麻疹について(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/k

[ekkkaku-kansenshou/measles/index.html](https://www.mhlw.go.jp/content/001131749.pdf)

- 麻疹の感染事例に関する啓発チラシ
<https://www.mhlw.go.jp/content/001131749.pdf>
- 麻疹の予防接種に関する啓発チラシ
<https://www.mhlw.go.jp/content/001093670.pdf>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou21/dl/yobou_0227.pdf
- 海外渡航者への麻疹の注意喚起（厚生労働省）
<https://www.mhlw.go.jp/content/001452642.pdf>
<https://www.mhlw.go.jp/content/001452645.pdf>
- 麻疹対策・ガイドラインなど（国立感染症研究所）
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/guidelines.html>
- 乾燥弱毒生麻疹風疹混合ワクチンの今後の供給見通し等について（令和6年12月12日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課及び感染症対策課連名事務連絡）
<https://www.mhlw.go.jp/content/001352011.pdf>
- 麻疹及び風疹の定期の予防接種に係る対応について」（令和7年3月11日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡）
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001440529.pdf>

「麻疹（はしか）」は 世界で流行している感染症です。

海外に行く方で、麻疹（はしか）にかかったことが明らかでない場合

海外に行く前に


- ✓ 麻疹の予防接種歴を母子手帳などで確認しましょう
- ✓ 定期接種を受けていない方は、接種を検討してください

世界における麻疹の流行状況

(令和6年8月～令和7年1月)


麻疹報告数 上位10の国々

国名	報告数
イエメン	7,584
パキスタン	6,661
インド	6,532
タイ	6,224
エチオピア	4,596
ルーマニア	4,478
アフガニスタン	4,358
インドネシア	3,346
キルギスタン	2,966
ベトナム	1,835




出典：WHO(世界保健機関) 麻疹報告数(直近6か月)
(令和7年3月現在；一部改変)

<https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/surveillance/monitoring/provisional-monthly-measles-and-rubella-data>



日本国内における麻疹の
推定感染地域
2025年第1週～第10週
(令和6年12月30日～
令和7年3月9日)



- ベトナム (10例)
- タイ (2例)
- パキスタン (1例)
- フィリピン (1例)
- イタリア/フランス (1例)
- 国内 (4例)
- 不明 (3例)

詳しくは
こちら

麻疹について 厚労省 検索

厚生労働省

麻疹について ▶



「麻疹（はしか）」は 世界で流行している感染症です。


海外に行った方で、麻疹（はしか）にかかったことが明らかでない場合
帰国した後に

- ☑ 帰国後2週間程度は健康状態（特に、高い熱や全身の発しん、せき、鼻水、目の充血などの症状）に注意しましょう

世界における麻疹の流行状況 (令和6年8月～令和7年1月)


麻疹報告数 上位10の国々

国名	報告数
イエメン	7,584
パキスタン	6,661
インド	6,532
タイ	6,224
エチオピア	4,596
ルーマニア	4,478
アフガニスタン	4,358
インドネシア	3,346
キルギスタン	2,966
ベトナム	1,835




出典：WHO(世界保健機関) 麻疹報告数(直近6か月)
(令和7年3月現在；一部改変)

<https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/surveillance/monitoring/provisional-monthly-measles-and-rubella-data>



日本国内における麻疹の
推定感染地域
2025年第1週～第10週
(令和6年12月30日～
令和7年3月9日)



- ベトナム (10例)
- タイ (2例)
- パキスタン (1例)
- フィリピン (1例)
- イタリア/フランス (1例)
- 国内 (4例)
- 不明 (3例)

詳しくは
こちら

麻疹について 厚労省 検索

厚生労働省

麻疹について ▶

