

| がん種          | レジメン名                             | レジメン内容(一般名)                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 黄色の行は今回更新分です |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MSI-High固形がん | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                      |
| MSI-High固形がん | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                                                                                                                                                      |
| TMB-High固形がん | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                     |
| TMB-High固形がん | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(400mg/body) d1 q6w                                                                                                                                                                                                                                     |
| 悪性軟部腫瘍       | DXR                               | ドキシゾリン(75mg/㎡)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                            |
| 悪性軟部腫瘍       | エリフリン                             | エリフリン(1.4mg/㎡)d1, 8 q3w                                                                                                                                                                                                                                         |
| 悪性リンパ腫       | V-CAP療法                           | ドキシゾリン(50mg/㎡)d1+シクロホスファミド(750mg/㎡)d1+ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1, 4, 8, 11+ブレドニゾロン(60mg/㎡)d1-5 q3w                                                                                                                                                                       |
| 悪性リンパ腫       | VR-CAP療法                          | リツキシマブ(375mg/㎡)d1+ドキシゾリン(50mg/㎡)d1+シクロホスファミド(750mg/㎡)d1+ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1, 4, 8, 11+ブレドニゾロン(60mg/㎡)d1-5 q3w                                                                                                                                                     |
| 悪性リンパ腫       | A+AVD                             | フレントキシマブベドテン(1.2mg/kg)d1, 15+ドキシゾリン(25mg/㎡)d1, 15+ビンブラスチン(6mg/㎡)d1, 15+ダカルバジン(375mg/㎡)d1, 15 q4w                                                                                                                                                                |
| 悪性リンパ腫       | A+CHP                             | フレントキシマブベドテン(1.8mg/kg)d1+シクロホスファミド(750mg/㎡)d1+ドキシゾリン(50mg/㎡)d1+ブレドニゾロン(60mg/㎡)d1-5 q3w                                                                                                                                                                          |
| 悪性リンパ腫       | ABVD                              | ドキシゾリン(25mg/㎡)d1, 15+プレオマイシン(10mg/㎡)d1, 15+ビンブラスチン(6mg/㎡)d1, 15+ダカルバジン(375mg/㎡)d1, 15 q4w                                                                                                                                                                       |
| 悪性リンパ腫       | BEACOPPbaseline                   | エトボシド(100mg/㎡)d1-3+ドキシゾリン(25mg/㎡)d1+シクロホスファミド(650mg/㎡)d1+ビンクリスチン(1.4mg/㎡)d8+プレオマイシン(10mg/㎡)d8+ブレドニゾロン(40mg/㎡)d1-14+プロカルバジン(100mg/㎡)d1-7 q3w                                                                                                                     |
| 悪性リンパ腫       | Brentuximab Vedotin               | フレントキシマブベドテン(1.8mg/kg)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                    |
| 悪性リンパ腫       | Dose escalated BEACOPP            | エトボシド(100mg/㎡)×2 d1-3+ドキシゾリン(35mg/㎡)d1+シクロホスファミド(1250mg/㎡)d1+ビンクリスチン(1.4mg/㎡)d8+プレオマイシン(10mg/㎡)d8+ブレドニゾロン(40mg/㎡)d1-14+プロカルバジン(100mg/㎡)d1-7 q3w                                                                                                                 |
| 悪性リンパ腫       | Epcoritamab(10コース目以降)             | エプコリタマブ(48mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                        |
| 悪性リンパ腫       | Epcoritamab(1コース目)                | エプコリタマブ(0.16mg/body)d1+エプコリタマブ(0.8mg/body)d8+エプコリタマブ(48mg/body)d15, 22 q4w                                                                                                                                                                                      |
| 悪性リンパ腫       | Epcoritamab(2, 3コース目)             | エプコリタマブ(48mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                                                                                                                                                                                                                             |
| 悪性リンパ腫       | Epcoritamab(4~9コース目)              | エプコリタマブ(48mg/body)d1, 15 q4w                                                                                                                                                                                                                                    |
| 悪性リンパ腫       | GPD±R                             | ゲムタピン(1000mg/㎡)d1, d8+シスプラチン(75mg/㎡)d1+リツキシマブ(375mg/㎡)d8+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1-4 q3w                                                                                                                                                          |
| 悪性リンパ腫       | mGDP±R                            | ゲムタピン(1000mg/㎡)d1, 8+カルボプラチン(AUC5)d1+リツキシマブ(375mg/㎡)d8+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1-4 q3w                                                                                                                                                            |
| 悪性リンパ腫       | Pola-BR(1コース目)                    | リツキシマブ(375mg/㎡)d1+ボラツズマブベドテン(1.8mg/kg)d2+ベンダムスチン(90mg/㎡)d2, 3 q3w                                                                                                                                                                                               |
| 悪性リンパ腫       | Pola-BR(2~6コース目)                  | リツキシマブ(375mg/㎡)d1+ボラツズマブベドテン(1.8mg/kg)d1+ベンダムスチン(90mg/㎡)d1, 2 q3w                                                                                                                                                                                               |
| 悪性リンパ腫       | Pola-R-CHP                        | リツキシマブ(375mg/㎡)d1+ボラツズマブベドテン(1.8mg/kg)d1+ドキシゾリン(50mg/㎡)d1+シクロホスファミド(750mg/㎡)d1+ブレドニゾロン(60mg/㎡)d1-5 q3w                                                                                                                                                          |
| 悪性リンパ腫       | POMP                              | ビンクリスチン(2mg/body)d1+ブレドニゾロン(内服200mg/body)d1-5+メトトレキサート(内服20mg/㎡)d1, 8, 15, 22+メルカプトプリン(内服150mg/body)d1-28 q4w                                                                                                                                                   |
| 悪性リンパ腫       | R-BAC                             | リツキシマブ(375mg/㎡)d1+ベンダムスチン(70mg/㎡)d2, 3+シタラビン(800mg/㎡)d2, 3, 4 q4w                                                                                                                                                                                               |
| 悪性リンパ腫       | R-Bendamustine                    | ベンダムスチン(90mg/㎡)d1, 2+リツキシマブ(375mg/㎡)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                      |
| 悪性リンパ腫       | R-CEOP                            | リツキシマブ(375mg/㎡)d1+エトボシド(50mg/㎡)d1+ビンクリスチン(1.4mg/㎡)d1+シクロホスファミド(750mg/㎡)d1+ブレドニゾロン(60mg/㎡)d1-5+エトボシド(内服100mg/㎡)d2, 3 q3w                                                                                                                                         |
| 悪性リンパ腫       | R-VD                              | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1, 4, 8, 11+リツキシマブ(375mg/㎡)d1+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1-4 q3w                                                                                                                                                                     |
| 悪性リンパ腫       | ニボルマブ(2週間間隔)                      | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                                         |
| 悪性リンパ腫       | ニボルマブ(4週間間隔)                      | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                         |
| 悪性リンパ腫       | プラトレキサート                          | プラトレキサート(30mg/㎡)d1, 8, 15, 22, 29 q7w                                                                                                                                                                                                                           |
| 悪性リンパ腫       | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                      |
| 悪性リンパ腫       | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                                                                                                                                                      |
| 悪性リンパ腫       | リツキシマブ                            | リツキシマブ(375mg/㎡)d1 q1w                                                                                                                                                                                                                                           |
| 悪性リンパ腫       | ロミデプシン                            | ロミデプシン(14mg/㎡)d1, 8, 15 q4w                                                                                                                                                                                                                                     |
| 悪性黒色腫        | ニボルマブ(2週間間隔)(ニボルマブ+イビリマブの5コース目以降) | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                                         |
| 悪性黒色腫        | ニボルマブ(4週間間隔)(ニボルマブ+イビリマブの5コース目以降) | ニボルマブ(480mg/body) d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                        |
| 悪性黒色腫        | ニボルマブ+イビリマブ                       | ニボルマブ(80mg/body) d1+イビリマブ(3mg/kg) d1 q3w                                                                                                                                                                                                                        |
| 胃がん          | CapeOX                            | オキサリプラチン(130mg/㎡)d1+カベシタビン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                                                       |
| 胃がん          | CapeOX+トラスツズマブ 1コース目用             | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg)d1+オキサリプラチン(130mg/㎡)d1+カベシタビン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                      |
| 胃がん          | CapeOX+トラスツズマブ 2コース目以降用           | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg) d1+オキサリプラチン(130mg/㎡)d1+カベシタビン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                     |
| 胃がん          | CapeOX+ニボルマブ                      | ニボルマブ(360mg/body) d1+オキサリプラチン(130mg/㎡) d1+カベシタビン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                                 |
| 胃がん          | ODDP+S1 外来用                       | シスプラチン(60mg/㎡)d8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1-21 q4~5w                                                                                                                                                                                                        |
| 胃がん          | ODDP+S1 入院用                       | シスプラチン(60mg/㎡)d8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1-21 q4~5w                                                                                                                                                                                                        |
| 胃がん          | GPT-11(A法)                        | イリノテカン(100mg/㎡)d1, 8, 15 q4w                                                                                                                                                                                                                                    |
| 胃がん          | GPT-11(biweekly)                  | イリノテカン(150mg/㎡)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                                           |
| 胃がん          | GPT-11+GDDP                       | イリノテカン(60mg/㎡)d1+シスプラチン(30mg/㎡)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                           |
| 胃がん          | GPT-11+GDDP(High dose)            | イリノテカン(70mg/㎡)d1, 15+シスプラチン(80mg/㎡)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                       |
| 胃がん          | DOC                               | ドセタキセル(60mg/㎡)d1 q3~4w                                                                                                                                                                                                                                          |
| 胃がん          | DS                                | ドセタキセル(40mg/㎡)d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                                        |
| 胃がん          | FP+トラスツズマブ 1コース目用                 | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg)d1+フルオロウシル(4000mg/㎡)d1+シスプラチン(80mg/㎡)d1 q3w                                                                                                                                                                                       |
| 胃がん          | FP+トラスツズマブ 2コース目以降用               | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg) d1+フルオロウシル(4000mg/㎡)d1+シスプラチン(80mg/㎡)d1 q3w                                                                                                                                                                                      |
| 胃がん          | G-SOX                             | オキサリプラチン(100mg/㎡)d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                                     |
| 胃がん          | mFOLFOX6                          | オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)d1 q2w                                                                                                                                                                           |
| 胃がん          | mFOLFOX6+ニボルマブ                    | ニボルマブ(240mg/body) d1+オキサリプラチン(85mg/㎡) d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)d1 q2w                                                                                                                                                     |
| 胃がん          | MTX-5-FU交代療法                      | メトトレキサート(100mg/㎡)d1+フルオロウシル(600mg/㎡)d1 a1~2w                                                                                                                                                                                                                    |
| 胃がん          | nab-PAC                           | ナブパクリタキセル(260mg/㎡)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                        |
| 胃がん          | nab-PAC+RAM                       | ラムシルマブ(8mg/kg)d1, 15+ナブパクリタキセル(100mg/㎡)d1, 8, 15 q4w                                                                                                                                                                                                            |
| 胃がん          | RAM                               | ラムシルマブ(8mg/kg)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                                            |
| 胃がん          | SOX+ニボルマブ(L-OHP100mg/㎡)           | ニボルマブ(360mg/body) d1+オキサリプラチン(100mg/㎡)d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                |
| 胃がん          | SOX+ニボルマブ(L-OHP130mg/㎡)           | ニボルマブ(360mg/body) d1+オキサリプラチン(130mg/㎡)d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                |
| 胃がん          | weeklyPAC                         | パクリタキセル(80mg/㎡)d1, 8, 15 q4w                                                                                                                                                                                                                                    |
| 胃がん          | weeklyPAC+RAM                     | ラムシルマブ(8mg/kg)d1, 15+パクリタキセル(80mg/㎡)d1, 8, 15 q4w                                                                                                                                                                                                               |
| 胃がん          | XP                                | シスプラチン(80mg/㎡)d1+カベシタビン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                                                          |
| 胃がん          | XP+トラスツズマブ 1コース目用                 | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg) d1+シスプラチン(80mg/㎡)d1+カベシタビン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                        |
| 胃がん          | XP+トラスツズマブ 2コース目以降用               | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg) d1+シスプラチン(80mg/㎡)d1+カベシタビン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                        |
| 胃がん          | XP+トラスツズマブ 外来2コース目以降用             | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg) d1+シスプラチン(80mg/㎡)d1+カベシタビン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                        |
| 胃がん          | XP+トラスツズマブ(CDDPなし) 1コース目用         | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg) d1+カベシタビン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                                         |
| 胃がん          | XP+トラスツズマブ(CDDPなし) 2コース目以降用       | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg) d1+カベシタビン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                                         |
| 胃がん          | トラスツズマブデルクステカン                    | トラスツズマブ(6.4mg/kg)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                         |
| 胃がん          | ニボルマブ(2週間間隔)                      | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                                         |
| 胃がん          | ニボルマブ(4週間間隔)                      | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                         |
| 胃がん          | CapeOX+ベムプロリズマブ                   | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1+オキサリプラチン(130mg/㎡) d1+カベシタビン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                              |
| 陰茎がん         | TIP                               | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+イホスファミド(1200mg/㎡)d1-3+シスプラチン(25mg/㎡)d1-3 q3~4w                                                                                                                                                                                               |
| 肝臓がん         | low dose FP                       | シスプラチン(7mg/㎡)d1-5+フルオロウシル(170mg/㎡)d1-5 q1w                                                                                                                                                                                                                      |
| 褐色細胞腫        | CVD 外来用                           | シクロホスファミド(750mg/㎡)d1+ビンクリスチン(1.4mg/㎡)・MAX2mg/body)d1+ダカルバジン(600mg/㎡)d1, 2 q3~4w                                                                                                                                                                                 |
| 褐色細胞腫        | CVD 入院用                           | シクロホスファミド(750mg/㎡)d1+ビンクリスチン(1.4mg/㎡)・MAX2mg/body)d1+ダカルバジン(600mg/㎡)d1, 2 q3~4w                                                                                                                                                                                 |
| 肝芽腫          | VI                                | ビンクリスチン(1.5mg/㎡)・MAX2mg/body)d1+イリノテカン(50mg/㎡)d1-5 q3w                                                                                                                                                                                                          |
| 肝臓がん         | CDDP+5-FU肝動注 1コース目・2コース目用         | シスプラチン(50mg/body)d1+フルオロウシル(bolus250mg/body)d1+フルオロウシル(1250mg/body120hrs)d1 q1w                                                                                                                                                                                 |
| 肝臓がん         | CDDP+5-FU肝動注 3コース目以降用             | シスプラチン(20mg/body)d1+フルオロウシル(1250mg/body120hrs)d1 q2w                                                                                                                                                                                                            |
| 肝臓がん         | CDDP肝動注                           | シスプラチン(50mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                         |
| 肝臓がん         | DXR肝動注                            | ドキシゾリン(30mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                         |
| 肝臓がん         | RAM                               | ラムシルマブ(8mg/kg)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                                            |
| 肝臓がん         | アテゾリズマブ+BV                        | アテゾリズマブ(1200mg/body) d1+ベバシズマブ(15mg/kg) d1 q3w                                                                                                                                                                                                                  |
| 肝臓がん         | エドルビシン肝動注                         | エドルビシン(50mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                         |
| 肝臓がん         | デュルバルマブ(維持療法)                     | デュルバルマブ(1500mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                      |
| 肝臓がん         | デュルバルマブ+トレメリマブ                    | トレメリマブ(300mg/body)d1+デュルバルマブ(1500mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                 |
| 急性白血病        | AZA                               | アザシチジン(75mg/㎡)d1-7 q4w                                                                                                                                                                                                                                          |
| 急性白血病        | AZA+Ven(1コース目)                    | アザシチジン(75mg/㎡)d1-7+ベネトクラクス(10~400mg/body)d1-28 q4w                                                                                                                                                                                                              |
| 急性白血病        | AZA+Ven(2コース目以降)                  | アザシチジン(75mg/㎡)d1-7+ベネトクラクス(50~400mg/body)d1-28 q4w                                                                                                                                                                                                              |
| 急性白血病        | GO 6mg day1.3mg d8 分割投与           | ゲムツズマブオゾガマイシン(6mg/㎡) d1+ゲムツズマブオゾガマイシン(3mg/㎡) d8 q1w                                                                                                                                                                                                             |
| 急性白血病        | GO day1.4.7.3分割投与                 | ゲムツズマブオゾガマイシン(3mg/㎡) d1, 4, 7 q1w                                                                                                                                                                                                                               |
| 急性白血病        | GO地固め療法 2mg day1 単回投与             | ゲムツズマブオゾガマイシン(2mg/㎡) d1 q1w                                                                                                                                                                                                                                     |
| 急性白血病        | GO地固め療法 2mg day1 単回投与             | メトトレキサート(150mg/㎡)d1.15.29+メトトレキサート(12mg/body)d29+シタラビン(30mg/body)d29+ヒドロコルチゾン(25mg/body)d1+メルカプトプリン(内服50mg/㎡)d1-28 q6w                                                                                                                                          |
| 急性白血病        | JALSG-ALL202-U(維持療法(1)(3))        | ビンクリスチン(1.5mg/kg)d1, 8, 15+シクロホスファミド(600mg/㎡)d8+L-アスパラギナーゼ(10000K.U./㎡) d2, 9, 16+ブレドニゾロン(内服40mg/㎡)d1-17 q4w                                                                                                                                                    |
| 急性白血病        | JALSG-ALL202-U(維持療法(2))           | ビンクリスチン(1.5mg/kg)d1, 8, 15+ビラルビシン(25mg/㎡)d8+L-アスパラギナーゼ(10000K.U./㎡) d2, 9, 16+ブレドニゾロン(内服40mg/㎡)d1-17 q4w                                                                                                                                                        |
| 急性白血病        | JALSG-ALL202-U(維持療法(4))           | ビンクリスチン(1.5mg/kg)d8, 15, 22, 29+ビラルビシン(25mg/㎡)d8, 9+シクロホスファミド(1200mg/㎡)d10+L-アスパラギナーゼ(6000K.U./㎡) d16, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 32+デキサメタゾン(8.25mg/㎡)d8-14+ブレドニゾロン(60mg/㎡)d1-31+メトトレキサート(12mg/body)d1, 8, 22+シタラビン(30mg/body)d8, 22+ヒドロコルチゾン(25mg/body)d8, 22 q5w |
| 急性白血病        | JALSG-ALL202-U(寛解導入療法)            | ビンクリスチン(1.5mg/kg)d1, 8, 15+ビラルビシン(25mg/㎡)d1, 8+シクロホスファミド(1200mg/㎡)d1, 8+L-アスパラギナーゼ(6000K.U./㎡) d2, 4, 6, 9, 11, 13+メトトレキサート(12mg/body) d1+シタラビン(30mg/body) d1+ヒドロコルチゾン(25mg/body) d1+ブレドニゾロン(内服40mg/㎡)d1-17 q4w                                                 |
| 急性白血病        | JALSG-ALL202-U(再寛解導入療法)           | メトトレキサート(3000mg/㎡)d1, 8+メトトレキサート(12mg/body)d2, 9+シタラビン(30mg/body)d2, 9+ヒドロコルチゾン(25mg/body)d2, 9 q2w                                                                                                                                                             |

| がん種          | レジメン名                                             | レジメン内容(一般名)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 急性白血病        | JALSG-ALL202-U(地固め療法)                             | ピラロキシジン(25mg/㎡)d1,2+シタラビン(75mg/㎡)d1-6,d8-13+シクロホスファミド(750mg/㎡)d1,8+メトトレキサート(12mg/body)d1,8+シタラビン(30mg/body)d1,8+ヒドロコルチゾン(25mg/body)d1,8+メルカプトプリン(内服50mg/㎡)d1-14 q3w                                                                                                                                                                                        |
| 急性白血病        | POMP                                              | ピンクリスチン(1.3mg/㎡)d1+ブレドニゾロン(内服60mg/㎡)d1-5+メトトレキサート(内服20mg/㎡)d1、8、15、22+メルカプトプリン(内服60mg/㎡)d1-28 q4w                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 胸腺腫          | ADOC                                              | ドキシソルピシン(40mg/㎡)d1+シスプラチン(50mg/㎡)d1+ピンクリスチン(0.6mg/㎡・MAX1mg/body)d2+シクロホスファミド(700mg/㎡)d4+ブレドニゾロン(100mg/body)d1-5 q3w                                                                                                                                                                                                                                        |
| 胸腺腫          | CAMP                                              | シスプラチン(20mg/㎡)d1-4+ドキシソルピシン(40mg/㎡)d1+mブレドニゾロン(1000mg/body)d1-4+メチルブレドニゾロン(500mg/body)d5-6 q3w                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 血管肉腫         | DXR                                               | ドキシソルピシン(0.4~0.6mg/kg/d1-3 q3w)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 血管肉腫         | weeklyPAC                                         | パクリタキセル(80mg/㎡)d1、8、15 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 原発不明がん       | ニボルマブ(2週間間隔)                                      | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 原発不明がん       | ニボルマブ(4週間間隔)                                      | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 骨髄異形成症候群     | AZA                                               | アザシチジン(75mg/㎡)d1-7 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 肛門がん         | 5-FU+CDDP+RT(インフューザーポンプ使用)                        | フルオロウラシル(4000mg/㎡)d1+シスプラチン(75mg/㎡)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 肛門がん         | 5-FU+CDDP+RT(インフューザーポンプ不使用)                       | フルオロウラシル(1000mg/㎡)d1-4+シスプラチン(75mg/㎡)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 肛門がん         | 5-FU+MMC+同時放射線療法                                  | フルオロウラシル(1000mg/㎡)d1-4、d29-32、+マイトマシリン(10mg/㎡)d1、29 1コースの期間指定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 小児リンパ腫       | B-NHL-14 COP(B)                                   | ピンクリスチン(1.0mg/㎡・MAX2mg/body)d1+シクロホスファミド(300mg/㎡)d1+ブレドニゾロン(60mg/㎡)d1-5+メトトレキサート(8-15mg/body)d1+ヒドロコルチゾン(8-15mg/body)d1 q5days                                                                                                                                                                                                                             |
| 小児リンパ腫       | B-NHL-14 COP(C1,C3)                               | ピンクリスチン(1.0mg/㎡・MAX2mg/body)d1+シクロホスファミド(300mg/㎡)d1+ブレドニゾロン(60mg/㎡)d1-5+メトトレキサート(8-15mg/body)d1+ヒドロコルチゾン(15-30mg/body)d1,3,5+ヒドロコルチゾン(8-15mg/body)d1,3,5 q5days                                                                                                                                                                                            |
| 神経芽腫         | ジヌツキシマブ(GSF) 1、3、5コース目用                           | フルグルタチム(5μg/kg)d1-14+ジヌツキシマブ(17.5mg/㎡)d4-7 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 神経芽腫         | ジヌツキシマブ(IL-2) 2、4、6コース目用                          | ドセタキセル(75mg/㎡)d1+セロイキン(100mg/㎡)d8-11+ジヌツキシマブ(17.5mg/㎡)d8-11 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 子宮体がん        | AP                                                | ドキシソルピシン(60mg/㎡)d1+シスプラチン(50mg/㎡)d1 q3~4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 子宮体がん        | DC+デュルバルマブ                                        | ドセタキセル(70mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1+デュルバルマブ(1120mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 子宮体がん        | TC                                                | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3~4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 子宮体がん        | TC+デュルバルマブ                                        | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1+デュルバルマブ(1120mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 子宮体がん        | TC+ヘム7ロシマブ                                        | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+ヘム7ロシマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 子宮体がん        | weeklyPAC                                         | パクリタキセル(80mg/㎡)d1、8、15 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 子宮体がん        | デュルバルマブ(維持療法)                                     | デュルバルマブ(1500mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 子宮体がん        | デュルバルマブ+オラパリブ(維持療法)                               | デュルバルマブ(1500mg/body)d1+オラパリブ(600mg/body)d1-28 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 子宮体がん        | ベムプロリズマブ(3週間間隔)(維持療法)                             | ヘム7ロシマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 子宮体がん        | ベムプロリズマブ(3週間間隔)+レンパチニブ                            | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+レンパチニブ(20mg/body)d1-21 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 子宮体がん        | ベムプロリズマブ(6週間間隔)(維持療法)                             | ヘム7ロシマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 子宮体がん        | ベムプロリズマブ(6週間間隔)+レンパチニブ                            | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1+レンパチニブ(20mg/body)d1-42 q6w                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 子宮肉腫         | IAP                                               | イホスファミド(1000mg/body)d1-5+ドキシソルピシン(40mg/㎡)d1+シスプラチン(75mg/㎡)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 子宮頸がん        | BV(維持療法)                                          | ペバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 子宮頸がん        | BV+ベムプロリズマブ(維持療法)                                 | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+ペバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 子宮頸がん        | CCRT(CDDP+radiation) 入院用                          | シスプラチン(40mg/㎡)d1 q1w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 子宮頸がん        | CCRT(CDDP+radiation) 外来用                          | シスプラチン(40mg/㎡)d1 q1w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 子宮頸がん        | CCRT(CDDP+radiation)+ヘム7ロシマブ 外来用                  | シスプラチン(40mg/㎡)d1,8,15+ヘム7ロシマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 子宮頸がん        | CCRT(CDDP+radiation)+ヘム7ロシマブ 入院用                  | シスプラチン(40mg/㎡)d1,8,15+ヘム7ロシマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 子宮頸がん        | CPT-11(A法)                                        | イリノテカン(100mg/㎡)d1、8、15 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 子宮頸がん        | TC                                                | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3~4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 子宮頸がん        | TC+BV                                             | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1+ペバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 子宮頸がん        | TC+BV+ベムプロリズマブ                                    | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+ペバシズマブ(15mg/kg)d1+ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 子宮頸がん        | TC+ベムプロリズマブ                                       | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 子宮頸がん        | TP                                                | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+シスプラチン(50mg/㎡)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 子宮頸がん        | TP+BV                                             | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+シスプラチン(50mg/㎡)d1+ペバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 子宮頸がん        | TP+BV+ベムプロリズマブ                                    | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+シスプラチン(50mg/㎡)d1+ペバシズマブ(15mg/kg)d1+ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 子宮頸がん        | TP+ベムプロリズマブ                                       | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+シスプラチン(50mg/㎡)d1+ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 子宮頸がん        | weeklyTC                                          | パクリタキセル(60mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC2・MAX300mg/body)d1 q1w                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 子宮頸がん        | セシリマブ                                             | セシリマブ(350mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 子宮頸がん        | ベムプロリズマブ(3週間間隔)(維持療法)                             | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 子宮頸がん        | ベムプロリズマブ(6週間間隔)(維持療法)                             | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-B12 Ia2 day8-35                               | ピンクリスチン(1.5mg/㎡・MAX2mg/body)d1、8、15、22+ダウノルビシン(30mg/㎡)d1、8+L-アスバラギナーゼ(5000K.U./㎡)d5、8、11、14、17、20、23、26+ブレドニゾロン(60mg/㎡)d1-21+ブレドニゾロン(30→15→7.5mg/㎡)d22-30+メトトレキサート(8-12mg/body)d5、26(、11、20)+シタラビン(20-30mg/body)d5、26(、11、20)+ブレドニゾロン(6-10mg/body)d5、26(、11、20) q4w                                                                                        |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-B12 Ib day36-77                               | シクロホスファミド(1000mg/㎡)d1、29+シタラビン(75mg/㎡)d3-6、10-13、17-20、24-27+メルカプトプリン(60mg/㎡)d1-28+メトトレキサート(8-12mg/body)d10、24+シタラビン(20-30mg/body)d10、24+ブレドニゾロン(6-10mg/body)d10、24 q6w                                                                                                                                                                                    |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-B12 III                                       | ピンクリスチン(1.5mg/㎡・MAX2mg/body)d1、8+ヒドロコルチゾン(25mg/㎡)d1、8+シクロホスファミド(500mg/㎡)d15+シタラビン(75mg/㎡)d17-20、24-27+10歳以上デキサメタゾン(10mg/㎡)d1-7、15-21+10歳未満デキサメタゾン(10mg/㎡)d1-14+10歳未満デキサメタゾン(5→2.5→1.25mg/㎡)d15-23+メルカプトプリン(60mg/㎡)d15-28+L-アスバラギナーゼ(10000K.U./㎡)d1、4、8、11+メトトレキサート(8-12mg/body)d17、24(d1)+シタラビン(20-30mg/body)d17、24(d1)+ブレドニゾロン(6-10mg/body)d17、24(d1) q5w |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-B12 Ip day1-7                                 | メトトレキサート(8-12mg/body)d1+ブレドニゾロン(15→30→60mg/㎡)d1-7 q1w                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-B12 M2                                        | メトトレキサート(2000mg/㎡)d8、22、36、50+メルカプトプリン(25mg/㎡)d1-56+メトトレキサート(8-12mg/body)d8、22、36、50+シタラビン(20-30mg/body)d8、22、36、50+ブレドニゾロン(6-10mg/body)d8、22、36、50 q10w                                                                                                                                                                                                   |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-B19(LR arm-B12SR.SRIR維持療法)                    | メトトレキサート(20mg/㎡)d1,8,15,22,29,36,43,50+6-MP(50mg/㎡)d1-56+メトトレキサート(8-12mg/body)d1+シタラビン(20-30mg/body)d1+ブレドニゾロン(6-10mg/body)d1 q8w                                                                                                                                                                                                                          |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-BFM95 Ia                                      | ピンクリスチン(1.5mg/㎡・MAX2mg/body)d8,15,22,29+ドキシソルピシン(30mg/㎡)d8,15,22,29+10歳以上(10mg/㎡)d1-7,15-21+10歳以上デキサメタゾン(5→2.5→1.25mg/㎡)d22-30+10歳未満デキサメタゾン(10mg/㎡)d1-21+10歳未満デキサメタゾン(5→2.5→1.25mg/㎡)d22-30+L-アスバラギナーゼ(10000K.U./㎡)d8,11,15,18+メトトレキサート(8-12mg/body)d1,18+キロサイト(20-30mg/body)d1,18+ブレドニゾロン(6-10mg/body)d1,18 q5w                                           |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-BFM95 Ib                                      | シクロホスファミド(1000mg/㎡)d1+シタラビン(75mg/㎡)d3,4,5,6,10,11,12,13+メルカプトプリン(60mg/㎡)d1-14+メトトレキサート(8-12mg/body)d3,10+シタラビン(20-30mg/body)d3,10+ブレドニゾロン(6-10mg/body)d3,10 q4w                                                                                                                                                                                            |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-Ph18 DP day1-35                               | ダサチニブ(80mg/㎡・MAX140mg/body)d1-35+ブレドニゾロン(60mg/㎡)d1-21+ブレドニゾロン(30→15→7.5mg/㎡)d22-30+メトトレキサート(8-12mg/body)d5,26(、11,20)+シタラビン(20-30mg/body)d5,26(、11,20)+ブレドニゾロン(6-10mg/body)d5,26(、11,20) q5w                                                                                                                                                               |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-Ph18 IA day36-56                              | ピンクリスチン(1.5mg/㎡・MAX2mg/body)d1,8,15+ダウノルビシン(30mg/㎡)d1,(8)+ブレドニゾロン(40mg/㎡)d1-14+ダサチニブ(60mg/㎡・MAX140mg/body)d1-21+メトトレキサート(8-12mg/body)d8+シタラビン(20-30mg/body)d8+ブレドニゾロン(6-10mg/body)d8 q3w                                                                                                                                                                   |
| 小児急性前骨髄球性白血病 | AML-P13 AA-I                                      | 三酸化ヒ素(0.15mg/kg)d2-6,9-13,16-20,23-30+4-トリチノイン(45mg/㎡・MAX80mg/body)d2-15+メトトレキサート(3-12mg/body)d1+シタラビン(6-30mg/body)d1+ヒドロコルチゾン(10-25mg/body)d1 q7w                                                                                                                                                                                                         |
| 小児急性前骨髄球性白血病 | AML-P13 ACD                                       | ダウノルビシン(45mg/㎡)d8-10+キロサイト(200mg/㎡)d8-14+トリチノイン(45mg/㎡・MAX80mg/body)+d1-35 q6w                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 小児急性前骨髄球性白血病 | AML-P13 HCMA                                      | シタラビン(3000mg/㎡×2)d1-3+ミキサントロン(10mg/㎡)d1+トリチノイン(45mg/㎡・MAX80mg/body)d4-10+メトトレキサート(3-12mg/body)d1+シタラビン(6-30mg/body)d1+ヒドロコルチゾン(10-25mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                         |
| 小児卵巣腫瘍       | BEP                                               | ペロマイシン(15mg/㎡)d1+エトポシド(100mg/㎡)d1-5+シスプラチン(20mg/㎡)d1-5 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 食道がん         | 5-FU+ベムプロリズマブ(インフューザーポンプ使用)(FP+ベムプロリズマブの7コース目以降)  | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+フルオロウラシル(4000mg/㎡)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 食道がん         | 5-FU+ベムプロリズマブ(インフューザーポンプ不使用)(FP+ベムプロリズマブの7コース目以降) | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+フルオロウラシル(800mg/㎡)d1-5 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 食道がん         | CDGP+5-FU(9905)(インフューザーポンプ使用)                     | フルオロウラシル(4000mg/㎡)d1+ネダプラチン(90mg/㎡)d1 q4~5w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 食道がん         | CDGP+5-FU(9905)(インフューザーポンプ不使用)                    | フルオロウラシル(800mg/㎡)d1-5+ネダプラチン(90mg/㎡)d1 q4~5w                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 食道がん         | DCF(1109)(インフューザーポンプ使用)                           | ドセタキセル(70mg/㎡)d1+シスプラチン(70mg/㎡)d1+フルオロウラシル(3750mg/㎡)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 食道がん         | DCF(1109)(インフューザーポンプ不使用)                          | ドセタキセル(70mg/㎡)d1+シスプラチン(70mg/㎡)d1+フルオロウラシル(750mg/㎡)d1-5 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 食道がん         | DOC                                               | ドセタキセル(70mg/㎡)d1 q3~4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 食道がん         | FOLFOLX+radiation                                 | オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウラシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウラシル(1600mg/㎡46hrs)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 食道がん         | FP(9907)(インフューザーポンプ使用)                            | フルオロウラシル(4000mg/㎡)d1+シスプラチン(80mg/㎡)d1 q3~4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 食道がん         | FP(9907)(インフューザーポンプ不使用)                           | フルオロウラシル(800mg/㎡)d1-5+シスプラチン(80mg/㎡)d1 q3~4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 食道がん         | FP(CDDP分割)(インフューザーポンプ使用)                          | フルオロウラシル(4000mg/㎡)d1+シスプラチン(20mg/㎡)d1-5 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 食道がん         | FP(CDDP分割)(インフューザーポンプ不使用)                         | フルオロウラシル(800mg/㎡)d1-5+シスプラチン(20mg/㎡)d1-5 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 食道がん         | FP+radiation(9708)(インフューザーポンプ使用)                  | フルオロウラシル(2800mg/㎡)d1+シスプラチン(70mg/㎡)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 食道がん         | FP+radiation(9708)(インフューザーポンプ不使用)                 | フルオロウラシル(700mg/㎡)d1-4+シスプラチン(70mg/㎡)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 食道がん         | FP+radiation(9906)(インフューザーポンプ使用)                  | フルオロウラシル(2000mg/㎡)d1、8+シスプラチン(40mg/㎡)d1、8 q5w                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 食道がん         | FP+radiation(9906)(インフューザーポンプ不使用)                 | フルオロウラシル(400mg/㎡)d1-5、8-12+シスプラチン(40mg/㎡)d1、8 q5w                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 食道がん         | FP+radiation(RTOG94-05)(インフューザーポンプ使用)             | フルオロウラシル(4000mg/㎡)d1+シスプラチン(75mg/㎡)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 食道がん         | FP+radiation(RTOG94-05)(インフューザーポンプ不使用)            | フルオロウラシル(1000mg/㎡)d1-4+シスプラチン(75mg/㎡)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 食道がん         | FP+ベムプロリズマブ(インフューザーポンプ使用)                         | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+フルオロウラシル(4000mg/㎡)d1+シスプラチン(80mg/㎡)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 食道がん         | FP+ベムプロリズマブ(インフューザーポンプ不使用)                        | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+フルオロウラシル(800mg/㎡)d1-5+シスプラチン(80mg/㎡)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 食道がん         | lowdoseFP+radiation(0303B)(インフューザーポンプ使用)          | フルオロウラシル(1000mg/㎡)d1+シスプラチン(4mg/㎡)d1-5 q1w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 食道がん         | lowdoseFP+radiation(0303B)(インフューザーポンプ不使用)         | フルオロウラシル(200mg/㎡)d1-5+シスプラチン(4mg/㎡)d1-5 q1w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 食道がん         | mFOLFOLX6                                         | オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウラシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウラシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 食道がん         | PAC(B法)                                           | パクリタキセル(100mg/㎡)d1、8、15、22、29、36 q7w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 食道がん         | ニボルマブ(2週間間隔)                                      | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 食道がん         | ニボルマブ(2週間間隔)+イビリムマブ                               | ニボルマブ(240mg/body)d1、15、29+イビリムマブ(1mg/kg)d1 q6w                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 食道がん         | ニボルマブ(3週間間隔)+イビリムマブ                               | ニボルマブ(360mg/body)d1、22+イビリムマブ(1mg/kg)d1 q6w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 食道がん         | ニボルマブ(4週間間隔)                                      | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 神経内分泌がん      | CPT-11+CDDP                                       | イリノテカン(65mg/㎡)d1、8+シスプラチン(30mg/㎡)d1、8 q3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| がん種          | レジメン名                     | レジメン内容(一般名)                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 腎芽腫          | EE-4A week0-2             | アクテノマイシンD(0.045mg/kg)d1+ビンクリスチン(0.05mg/kg・MAX2mg/body)d3、10 q16days                                                                                                                       |
| 腎芽腫          | EE-4A week12-18           | アクテノマイシンD(0.045mg/kg)d1+ビンクリスチン(0.067mg/kg・MAX2mg/body)d1 q3w                                                                                                                             |
| 腎芽腫          | EE-4A week3-8             | アクテノマイシンD(0.045mg/kg)d1+ビンクリスチン(0.05mg/kg・MAX2mg/body)d1、8、15 q3w                                                                                                                         |
| 腎芽腫          | EE-4A week9-11            | アクテノマイシンD(0.045mg/kg)d1+ビンクリスチン(0.05mg/kg・MAX2mg/body)d1、8 q3w                                                                                                                            |
| 腎細胞がん        | アベルマブ+アキシチニブ              | アベルマブ(10mg/kg)d1+アキシチニブ(10mg/body)d1-14 q2w                                                                                                                                               |
| 腎細胞がん        | テムシロリムス                   | テムシロリムス(25mg/body)d1 q1w                                                                                                                                                                  |
| 腎細胞がん        | ニボルマブ(2週間間隔)              | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                                                                                   |
| 腎細胞がん        | ニボルマブ(2週間間隔)+カボザンチニブ      | ニボルマブ(240mg/body)d1+カボザンチニブ(40mg/body)d1-14 q2w                                                                                                                                           |
| 腎細胞がん        | ニボルマブ(4週間間隔)              | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                   |
| 腎細胞がん        | ニボルマブ(4週間間隔)+カボザンチニブ      | ニボルマブ(480mg/body)d1+カボザンチニブ(40mg/body)d1-28 q4w                                                                                                                                           |
| 腎細胞がん        | ニボルマブ+イビリムマブ              | ニボルマブ(240mg/body)d1+イビリムマブ(1mg/kg)d1 q3w                                                                                                                                                  |
| 腎細胞がん        | ベムプロリスマブ(3週間間隔)+アキシチニブ    | ベムプロリスマブ(200mg/body)d1+アキシチニブ(10mg/body)d1-21 q3w                                                                                                                                         |
| 腎細胞がん        | ベムプロリスマブ(3週間間隔)+レンパチニブ    | ベムプロリスマブ(200mg/body)d1+レンパチニブ(20mg/body)d1-21 q3w                                                                                                                                         |
| 腎細胞がん        | ベムプロリスマブ(6週間間隔)+アキシチニブ    | ベムプロリスマブ(400mg/body)d1+アキシチニブ(10mg/body)d1-42 q6w                                                                                                                                         |
| 腎細胞がん        | ベムプロリスマブ(6週間間隔)+レンパチニブ    | ベムプロリスマブ(400mg/body)d1+レンパチニブ(20mg/body)d1-42 q6w                                                                                                                                         |
| 腎細胞がん        | ベムプロリスマブ(3週間間隔)           | ベムプロリスマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                |
| 腎細胞がん        | ベムプロリスマブ(6週間間隔)           | ベムプロリスマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                                                                                |
| 臓・消化管神経内分泌腫瘍 | dailySTZ                  | ザノサー(500mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q6w                                                                                                                                                       |
| 臓・消化管神経内分泌腫瘍 | dailySTZ+5-FU             | フルオロウシル(400mg/m <sup>2</sup> )d1-5+ザノサー(500mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q6w                                                                                                                    |
| 臓・消化管神経内分泌腫瘍 | weeklySTZ                 | ザノサー(1000mg/m <sup>2</sup> or 1250mg/m <sup>2</sup> or 1500mg/m <sup>2</sup> )d1 q1w                                                                                                      |
| 臓がん          | GEM                       | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15 q4w                                                                                                                                                 |
| 臓がん          | GEM+S1                    | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1、8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                |
| 臓がん          | mFOLFIRINOX               | オキサリプラチン(85mg/m <sup>2</sup> )d1+イリノテカン(150mg/m <sup>2</sup> )d1+レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウシル(2400mg/m <sup>2</sup> 46hrs)d1 q2w                                              |
| 臓がん          | nab-PAC+GEM               | ナパブリタキセル(125mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15+ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15 q4w                                                                                                          |
| 臓がん          | nal-IRI+5-FU+LV           | イリノテカン塩酸塩水和物リボソーム(70mg/m <sup>2</sup> )d1+レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウシル(2400mg/m <sup>2</sup> 46hrs)d1 q2w                                                                     |
| 臓がん(医師限定)    | FOLFIRINOX                | オキサリプラチン(85mg/m <sup>2</sup> )d1+イリノテカン(180mg/m <sup>2</sup> )d1+レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウシル(bolus400mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウシル(2400mg/m <sup>2</sup> 46hrs)d1 q2w        |
| 精巣腫瘍         | PEB                       | シスプラチン(20mg/m <sup>2</sup> )d1-5+エトポシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-5+プレオマイシン(30mg/body)d1、8、15 q3w                                                                                           |
| 精巣腫瘍         | TIN                       | バクリタキセル(210mg/m <sup>2</sup> )d1+イホスファミド(1200mg/m <sup>2</sup> )d2-6+ネダプラチン(100mg/m <sup>2</sup> )d2 q3w                                                                                  |
| 精巣腫瘍         | TIP                       | バクリタキセル(210mg/m <sup>2</sup> )d1+イホスファミド(1200mg/m <sup>2</sup> )d2-6+シスプラチン(20mg/m <sup>2</sup> )d2-6 q3w                                                                                 |
| 精巣腫瘍         | VIP                       | エトポシド(75mg/m <sup>2</sup> )d1-5+イホスファミド(1200mg/m <sup>2</sup> )d1-5+シスプラチン(20mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q3w                                                                                  |
| 前立腺がん        | CAB+PSL                   | カルビタキセル(25mg/m <sup>2</sup> )d1+ブレドニゾン(10mg/body)d1-21 q3w                                                                                                                                |
| 前立腺がん        | DOC+DEX                   | ドセタキセル(75mg/m <sup>2</sup> )d1+デキサメタゾン(1mg/body)d1-21 q3w                                                                                                                                 |
| 前立腺がん        | DOC+PSL                   | ドセタキセル(75mg/m <sup>2</sup> )d1+ブレドニゾン(10mg/body)d1-21 q3w                                                                                                                                 |
| 前立腺がん(小細胞がん) | CBDC+VP-16                | エトポシド(80mg/m <sup>2</sup> )d1-3+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3~4w                                                                                                                       |
| 多発性骨髄腫       | DaraCyBoRd(1、2コース目)       | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、8、15、22+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15、22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+シクロホスファミド(内服300mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15、22 q4w     |
| 多発性骨髄腫       | DaraCyBoRd(3~6コース目)       | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、15+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15、22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+シクロホスファミド(内服300mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15、22 q5w          |
| 多発性骨髄腫       | DaraCyBoRd(7コース目以降)       | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15、22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+シクロホスファミド(内服300mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15、22 q6w             |
| 多発性骨髄腫       | Isa±DEX(1コース目)            | イサツキシマブ(20mg/kg)d1、8、15、22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22 q4w                                                                                                            |
| 多発性骨髄腫       | Isa±DEX(2コース目以降)          | イサツキシマブ(20mg/kg)d1、15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22 q4w                                                                                                                 |
| 多発性骨髄腫       | IsaKD(1コース目)              | イサツキシマブ(10mg/kg)d1、8、15、22+カルフィルゾミブ(20mg/m <sup>2</sup> )d1、2+カルフィルゾミブ(56mg/m <sup>2</sup> )d8、9、15、16+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、8、9、15、16、22 q4w                       |
| 多発性骨髄腫       | IsaKD(2コース目以降)            | イサツキシマブ(10mg/kg)d1、15+カルフィルゾミブ(56mg/m <sup>2</sup> )d1、2、8、9、15、16+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、8、9、15、16、22 q4w                                                           |
| 多発性骨髄腫       | DKD(1コース目)                | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、8、15、22+カルフィルゾミブ(20mg/m <sup>2</sup> )d1、2+カルフィルゾミブ(56mg/m <sup>2</sup> )d8、9、15、16+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、8、9、15、16、22 q4w     |
| 多発性骨髄腫       | DKD(2コース目)                | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、8、15、22+カルフィルゾミブ(20mg/m <sup>2</sup> )d1、2+カルフィルゾミブ(56mg/m <sup>2</sup> )d1、2、8、9、15、16+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、8、9、15、16、22 q4w |
| 多発性骨髄腫       | DKD(3~6コース目)              | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、15+カルフィルゾミブ(56mg/m <sup>2</sup> )d1、15+カルフィルゾミブ(56mg/m <sup>2</sup> )d1、2、8、9、15、16+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、8、9、15、16、22 q4w     |
| 多発性骨髄腫       | DKD(7コース目以降)              | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1+カルフィルゾミブ(56mg/m <sup>2</sup> )d1、2、8、9、15、16+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、8、9、15、16、22 q4w                                            |
| 多発性骨髄腫       | DPD(1、2コース目)              | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、8、15、22+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22 q4w                                                                  |
| 多発性骨髄腫       | DPD(3~6コース目)              | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、15+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22 q4w                                                                       |
| 多発性骨髄腫       | DPD(7コース目以降)              | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22 q4w                                                                          |
| 多発性骨髄腫       | DRD(1、2コース目 ダラムマブ静注)      | ダラムマブ(16mg/kg)d1、8、15、22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                                     |
| 多発性骨髄腫       | DRD(1、2コース目)              | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、8、15、22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                 |
| 多発性骨髄腫       | DRD(3~6コース目 ダラムマブ静注)      | ダラムマブ(16mg/kg)d1、15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                                          |
| 多発性骨髄腫       | DRD(3~6コース目)              | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+レナリドミド(内服25mg/body)d1、8、15、22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                        |
| 多発性骨髄腫       | DRD(7コース目以降 ダラムマブ静注)      | ダラムマブ(16mg/kg)d1+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                                             |
| 多発性骨髄腫       | DRD(7コース目以降)              | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                         |
| 多発性骨髄腫       | DVD(1~3コース目 ダラムマブ静注)      | ダラムマブ(16mg/kg)d1、8、15+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1、4、8、11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、4、5、8、9、11、12 q3w                                                                |
| 多発性骨髄腫       | DVD(1~3コース目)              | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、8、15+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1、4、8、11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、4、5、8、9、11、12 q3w                                            |
| 多発性骨髄腫       | DVD(4コース目以降 ダラムマブ静注)      | ダラムマブ(16mg/kg)d1+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1、4、8、11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、4、5、8、9、11、12 q4w                                                                     |
| 多発性骨髄腫       | DVD(4コース目以降)              | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1、4、8、11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、4、5、8、9、11、12 q3w                                                 |
| 多発性骨髄腫       | DVMP(1コース目)               | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、8、15、22、29、36+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1、4、8、11、22、25、29、32+メルファラン(内服9mg/m <sup>2</sup> )d1-4+ブレドニゾン(内服60mg/m <sup>2</sup> )d1-4 q6w            |
| 多発性骨髄腫       | DVMP(2コース目以降)             | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、22+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1、8、22、29+メルファラン(内服9mg/m <sup>2</sup> )d1-4+ブレドニゾン(内服60mg/m <sup>2</sup> )d1-4 q6w                                  |
| 多発性骨髄腫       | DwKD(1コース目)               | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、8、15、22+カルフィルゾミブ(20mg/m <sup>2</sup> )d1+カルフィルゾミブ(70mg/m <sup>2</sup> )d8、15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22 q4w                     |
| 多発性骨髄腫       | DwKD(2コース目)               | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、8、15、22+カルフィルゾミブ(70mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22 q4w                                                    |
| 多発性骨髄腫       | DwKD(3~6コース目)             | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、15+カルフィルゾミブ(70mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22 q4w                                                         |
| 多発性骨髄腫       | DwKD(7コース目以降)             | ダラムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1+カルフィルゾミブ(70mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22 q4w                                                            |
| 多発性骨髄腫       | Elranatamab(1コース目)        | エルラナタマブ(12mg/body)d1+エルラナタマブ(32mg/body)d4+エルラナタマブ(76mg/body)d8、15、22 q4w                                                                                                                  |
| 多発性骨髄腫       | Elranatamab(2~6コース目)      | エルラナタマブ(76mg/body)d1、8、15、22 q4w                                                                                                                                                          |
| 多発性骨髄腫       | Elranatamab(7コース目以降)      | エルラナタマブ(76mg/body)d1、15 q4w                                                                                                                                                               |
| 多発性骨髄腫       | EPD(1、2コース目)              | エロツスマブ(10mg/kg)d1、8、15、22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21 q4w                                                                                     |
| 多発性骨髄腫       | EPD(3コース目以降)              | エロツスマブ(20mg/kg)d1+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21 q4w                                                                                             |
| 多発性骨髄腫       | ERD(1、2コース目)              | エロツスマブ(10mg/kg)d1、8、15、22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                                    |
| 多発性骨髄腫       | ERD(3コース目以降)              | エロツスマブ(10mg/kg)d1、15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                                         |
| 多発性骨髄腫       | IRd                       | レナリドミド(内服25mg/body)d1-21+イキサゾミブ(内服4mg/body)d1、8、15+デキサメタゾン(内服40mg/body)d1、8、15、22 q4w                                                                                                     |
| 多発性骨髄腫       | IsaPD(1コース目)              | イサツキシマブ(10mg/kg)d1、8、15、22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21 q4w                                                                                    |
| 多発性骨髄腫       | IsaPD(2コース目以降)            | イサツキシマブ(10mg/kg)d1、15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21 q4w                                                                                         |
| 多発性骨髄腫       | Kd                        | カルフィルゾミブ(初回20mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降70mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22(q22は10コース目以降投与なし) q4w                                                   |
| 多発性骨髄腫       | KRD(13コース目以降)             | カルフィルゾミブ(27mg/m <sup>2</sup> )d1、2、15、16+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                     |
| 多発性骨髄腫       | KRD(1コース目)                | カルフィルゾミブ(20mg/m <sup>2</sup> )d1、2+カルフィルゾミブ(27mg/m <sup>2</sup> )d8、9、15、16+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                  |
| 多発性骨髄腫       | KRD(2~12コース目)             | カルフィルゾミブ(27mg/m <sup>2</sup> )d1、2、8、9、15、16+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                 |
| 多発性骨髄腫       | VCD                       | ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15、22+シクロホスファミド(内服300mg/m <sup>2</sup> )d1、8、15、22+デキサメタゾン(内服40mg/body)d1、8、15、22 q4~5w                                                                 |
| 多発性骨髄腫       | VD(biweekly VD ボルテゾミブ皮下注) | ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1、15+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、15 q4~5w                                                                                                     |

| がん種        | レジメン名                               | レジメン内容(一般名)                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 多発性骨髄腫     | VD(twice per week VD ボルテゾミブ皮下注)     | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1, 4, 8, 11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 q3w                                   |
| 多発性骨髄腫     | VD(weekly VD ボルテゾミブ皮下注)             | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1, 8, 15, 22+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 8, 15, 22 q4~5w                                            |
| 多発性骨髄腫     | VenBd療法                             | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1, 8, 15, 22+ベネトクラクス(10~600mg/body)d1-35+ デキサメタゾン(内服40mg/body)d1, 8, 15, 22 q5w                                    |
| 多発性骨髄腫     | VenD療法                              | タラウムマブ・ボルネアロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 8, 15, 22+ベネトクラクス(10~600mg/body)d1-28+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w |
| 多発性骨髄腫     | VenKd療法                             | カルフィルゾミブ(初回20mg/㎡, 2回目以降70mg/㎡)d1, 8, 15+ベネトクラクス(10~600mg/body)d1-28+デキサメタゾン(内服40mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                         |
| 多発性骨髄腫     | VMP                                 | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1, 8, 15, 22+メルファラン(内服6mg/㎡)d1-4+ブレドニゾン(内服40mg/㎡)d1-4 q5w                                                          |
| 多発性骨髄腫     | VPD(1~8コース目)                        | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1, 4, 8, 11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-14 q3w           |
| 多発性骨髄腫     | VPD(9コース目以降)                        | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1, 8+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 8, 9+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-14 q3w                                |
| 多発性骨髄腫     | VRD                                 | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1, 4, 8, 11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12+レナリドミド(内服25mg/body)d1-14 q3w          |
| 大腸がん       | 5-FU+LV+BV                          | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                                           |
| 大腸がん       | 5-FU+LV+BV(末梢ルート)                   | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                                           |
| 大腸がん       | 5-FU肝動注                             | フルオロウシル(1000mg/㎡)d1 q1w                                                                                                            |
| 大腸がん       | CPT-11(A法)                          | イリノテカン(100mg/㎡)d1, 8, 15 q4w                                                                                                       |
| 大腸がん       | CPT-11(B法2回)                        | イリノテカン(150mg/㎡)d1, 15 q5w                                                                                                          |
| 大腸がん       | CPT-11(B法3回)                        | イリノテカン(150mg/㎡)d1, 15, 29 q7w                                                                                                      |
| 大腸がん       | FOLFIRI                             | イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                                          |
| 大腸がん       | FOLFIRI(末梢ルート)                      | イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                                          |
| 大腸がん       | FOLFIRI+BV                          | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                         |
| 大腸がん       | FOLFIRI+BV(末梢ルート)                   | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                         |
| 大腸がん       | FOLFIRI+RAM                         | ラムシルマブ(8mg/kg)d1+イリノテカン(180mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                         |
| 大腸がん       | FOLFIRI+セツキシマブ(1週間間隔)               | セツキシマブ(初回400mg/㎡, 2回目以降250mg/㎡)d1, d8+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w    |
| 大腸がん       | FOLFIRI+セツキシマブ(1週間間隔)(末梢ルート)        | セツキシマブ(初回400mg/㎡, 2回目以降250mg/㎡)d1, d8+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w    |
| 大腸がん       | FOLFIRI+セツキシマブ(2週間間隔)               | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                        |
| 大腸がん       | FOLFIRI+セツキシマブ(2週間間隔)(末梢ルート)        | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                        |
| 大腸がん       | FOLFIRI+パニツムマブ                      | パニツムマブ(6mg/kg)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                         |
| 大腸がん       | FOLFIRI+パニツムマブ(末梢ルート)               | パニツムマブ(6mg/kg)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                         |
| 大腸がん       | HER+PER 1コース目用                      | トラスツズマブ(600mg/body)・ペルツズマブ(1200mg/body)d1 q3w                                                                                      |
| 大腸がん       | HER+PER 2コース目以降用                    | トラスツズマブ(600mg/body)・ペルツズマブ(600mg/body)d1 q3w                                                                                       |
| 大腸がん       | mFOLFOX6                            | オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                                         |
| 大腸がん       | mFOLFOX6(末梢ルート)                     | オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                                         |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+BV                         | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                        |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+BV(末梢ルート)                  | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                        |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+セツキシマブ(1週間間隔)              | セツキシマブ(初回400mg/㎡, 2回目以降250mg/㎡)d1, d8+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w   |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+セツキシマブ(1週間間隔)(末梢ルート)       | セツキシマブ(初回400mg/㎡, 2回目以降250mg/㎡)d1, d8+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w   |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+セツキシマブ(2週間間隔)              | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                       |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+セツキシマブ(2週間間隔)(末梢ルート)       | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                       |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+パニツムマブ                     | パニツムマブ(6mg/kg)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                        |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+パニツムマブ(末梢ルート)              | パニツムマブ(6mg/kg)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡46hrs)d1 q2w                        |
| 大腸がん       | SIR                                 | イリノテカン(150mg/㎡)d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1-14 q3w                                                                            |
| 大腸がん       | SIRB                                | ベパシズマブ(7.5mg/kg)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                       |
| 大腸がん       | SOX+BV                              | ベパシズマブ(7.5mg/kg)d1+オキサリプラチン(130mg/㎡)d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                     |
| 大腸がん       | TAS-102+BV                          | ベパシズマブ(5mg/kg)d1, 15+TAS-102(トリフルリジン・チピラシル)(内服)d1タ-6朝, d8タ-13朝 q4w                                                                 |
| 大腸がん       | XELIRI                              | イリノテカン(200mg/㎡)d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                            |
| 大腸がん       | XELIRI+BV                           | ベパシズマブ(7.5mg/kg)d1+イリノテカン(200mg/㎡)d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                         |
| 大腸がん       | XELOX                               | オキサリプラチン(130mg/㎡)d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                          |
| 大腸がん       | XELOX+BV                            | ベパシズマブ(7.5mg/kg)d1+オキサリプラチン(130mg/㎡)d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                       |
| 大腸がん       | カベシタピン+BV                           | ベパシズマブ(7.5mg/kg)d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                           |
| 大腸がん       | セツキシマブ(1週間間隔)                       | セツキシマブ(初回400mg/㎡, 2回目以降250mg/㎡)d1 q1w                                                                                              |
| 大腸がん       | セツキシマブ(1週間間隔)+CPT-11(1週間間隔)         | セツキシマブ(初回400mg/㎡, 2回目以降250mg/㎡)d1, d8, 15, 22, 29, 36+イリノテカン(100mg/㎡)d1, 8, 15, 22 q6w                                             |
| 大腸がん       | セツキシマブ(2週間間隔)                       | セツキシマブ(500mg/㎡)d1 q2w                                                                                                              |
| 大腸がん       | セツキシマブ(2週間間隔)+CPT-11(2週間間隔)         | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1 q2w                                                                                            |
| 大腸がん       | パニツムマブ                              | パニツムマブ(6mg/kg)d1 q2w                                                                                                               |
| 大腸がん       | パニツムマブ+CPT-11                       | パニツムマブ(6mg/kg)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1 q2w                                                                                             |
| 大腸がん(医師限定) | 5-FU+LV(FOLFOXIRIの13コース目以降用)        | レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(3200mg/㎡48hrs)d1 q2w                                                                                    |
| 大腸がん(医師限定) | 5-FU+LV+BV(FOLFOXIRI+BVの13コース目以降用)  | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(3200mg/㎡48hrs)d1 q2w                                                                   |
| 大腸がん(医師限定) | FOLFOXIRI                           | イリノテカン(165mg/㎡)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(3200mg/㎡48hrs)d1 q2w                                               |
| 大腸がん(医師限定) | FOLFOXIRI+BV                        | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+イリノテカン(165mg/㎡)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(3200mg/㎡48hrs)d1 q2w                              |
| 大腸がん(医師限定) | セツキシマブ(1週間間隔)+エンコラフェニブ              | セツキシマブ(初回400mg/㎡, 2回目以降250mg/㎡)d1+エンコラフェニブ(300mg/body)d1-7 q1w                                                                     |
| 大腸がん(医師限定) | セツキシマブ(1週間間隔)+エンコラフェニブ+ビニメチニブ       | セツキシマブ(初回400mg/㎡, 2回目以降250mg/㎡)d1+エンコラフェニブ(300mg/body)d1-7+ビニメチニブ(90mg/body)d1-7 q1w                                               |
| 大腸がん(医師限定) | セツキシマブ(2週間間隔)+エンコラフェニブ              | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+エンコラフェニブ(300mg/body)d1-14 q2w                                                                                    |
| 大腸がん(医師限定) | セツキシマブ(2週間間隔)+エンコラフェニブ+ビニメチニブ       | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+エンコラフェニブ(300mg/body)d1-14+ビニメチニブ(90mg/body)d1-14 q2w                                                             |
| 胆道がん       | GC                                  | ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1, 8+シスプラチン(25mg/㎡)d1, 8 q3w                                                                                      |
| 胆道がん       | GC+デュルバルマブ                          | デュルバルマブ(1500mg/body)d1+ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1, 8+シスプラチン(25mg/㎡)d1, 8 q3w                                                               |
| 胆道がん       | GC+ペムブロリズマブ(3週間間隔)                  | ペムブロリズマブ(200mg/body)d1+ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1, 8+シスプラチン(25mg/㎡)d1, 8 q3w                                                               |
| 胆道がん       | GC+ペムブロリズマブ(6週間間隔)                  | ペムブロリズマブ(400mg/body)d1+ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1, 8, 22, 29+シスプラチン(25mg/㎡)d1, 8, 22, 29 q6w                                               |
| 胆道がん       | GCS                                 | ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1+シスプラチン(25mg/㎡)d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-8朝 q2w                                                         |
| 胆道がん       | GEM                                 | ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1, 8, 15 q4w                                                                                                      |
| 胆道がん       | GEM+ペムブロリズマブ(3週間間隔)                 | ペムブロリズマブ(200mg/body)d1+ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1, 8 q3w                                                                                   |
| 胆道がん       | GEM+ペムブロリズマブ(6週間間隔)                 | ペムブロリズマブ(400mg/body)d1+ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1, 8, 22, 29 q6w                                                                           |
| 胆道がん       | GS                                  | ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1, 8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                      |
| 胆道がん       | デュルバルマブ(維持療法)                       | デュルバルマブ(1500mg/body)d1 q4w                                                                                                         |
| 唾液腺がん      | TC                                  | パクリタキセル(200mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                                                                               |
| 中枢神経胚細胞腫瘍  | CARE                                | エトボシド(150mg/㎡)d1-3+カルボプラチン(450mg/㎡)d1 q4w                                                                                          |
| 中枢神経胚細胞腫瘍  | ICE                                 | シスプラチン(20mg/㎡)d1-5+エトボシド(60mg/㎡)d1-5+イホスファミド(900mg/㎡)d1-5 q4w                                                                      |
| 頭頸部がん      | CBDCa+5-FU+radiation(インフューザーポンプ使用)  | カルボプラチン(70mg/㎡)d1-4+フルオロウシル(2400mg/㎡)d1 q3w                                                                                        |
| 頭頸部がん      | CBDCa+5-FU+radiation(インフューザーポンプ不使用) | カルボプラチン(70mg/㎡)d1-4+フルオロウシル(600mg/㎡)d1-4 q3w                                                                                       |
| 頭頸部がん      | CBDCa+5-FU+セツキシマブ(インフューザーポンプ使用)     | セツキシマブ(初回400mg/㎡, 2回目以降250mg/㎡)d1, 8, 15+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+フルオロウシル(4000mg/㎡)d1 q3w                                     |
| 頭頸部がん      | CBDCa+5-FU+セツキシマブ(インフューザーポンプ不使用)    | セツキシマブ(初回400mg/㎡, 2回目以降250mg/㎡)d1, 8, 15+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+フルオロウシル(1000mg/㎡)d1-4 q3w                                   |
| 頭頸部がん      | CBDCa+5-FU+ペムブロリズマブ(インフューザーポンプ使用)   | ペムブロリズマブ(200mg/body)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+フルオロウシル(4000mg/㎡)d1 q3w                                                       |
| 頭頸部がん      | CBDCa+5-FU+ペムブロリズマブ(インフューザーポンプ不使用)  | ペムブロリズマブ(200mg/body)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+フルオロウシル(1000mg/㎡)d1-4 q3w                                                     |
| 頭頸部がん      | CDDP+5-FU                           | フルオロウシル(750mg/㎡)d1-5+シスプラチン(60mg/㎡)d1 q3w                                                                                          |
| 頭頸部がん      | CDDP+5-FU+セツキシマブ(インフューザーポンプ使用)      | セツキシマブ(初回400mg/㎡, 2回目以降250mg/㎡)d1, 8, 15+シスプラチン(100mg/㎡)d1+フルオロウシル(4000mg/㎡)d1 q3w                                                 |
| 頭頸部がん      | CDDP+5-FU+セツキシマブ(インフューザーポンプ不使用)     | セツキシマブ(初回400mg/㎡, 2回目以降250mg/㎡)d1, 8, 15+シスプラチン(100mg/㎡)d1+フルオロウシル(1000mg/㎡)d1-4 q3w                                               |

| がん種    | レジメン名                                 | レジメン内容(一般名)                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 頭頸部がん  | CDDP+5-FU+ベムプロリズマブ(インフューザー・ポンプ 使用)    | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1+シスプラチン(100mg/m <sup>2</sup> ) d1+フルオロウラシル(4000mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                   |
| 頭頸部がん  | CDDP+5-FU+ベムプロリズマブ(インフューザー・ポンプ 不使用)   | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1+シスプラチン(100mg/m <sup>2</sup> ) d1+フルオロウラシル(1000mg/m <sup>2</sup> ) d1-4 q3w                                                 |
| 頭頸部がん  | CDDP+DOC+5-FU                         | シスプラチン(60mg/m <sup>2</sup> ) d1+ドセタキセル(60mg/m <sup>2</sup> ) d1+フルオロウラシル(700mg/m <sup>2</sup> ) d1-4 q3w                                           |
| 頭頸部がん  | CDDP+radiation                        | シスプラチン(100mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                                                                               |
| 頭頸部がん  | CDDP動注+radiation                      | シスプラチン(60mg/m <sup>2</sup> ) d1 q1w                                                                                                                |
| 頭頸部がん  | DOC                                   | ドセタキセル(60mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                                                                                |
| 頭頸部がん  | DOC+トラスツズマブ                           | トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg) d1+ドセタキセル(70mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                                               |
| 頭頸部がん  | PCE 1コース目用                            | セツキシマブ(400mg/m <sup>2</sup> ) d1+パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC1.5・MAX225mg/body) d1 q1w                                             |
| 頭頸部がん  | PCE 2コース目以降用                          | セツキシマブ(250mg/m <sup>2</sup> ) d1+パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC1.5・MAX225mg/body) d1 q1w                                             |
| 頭頸部がん  | weeklyCDDP+radiation                  | シスプラチン(40mg/m <sup>2</sup> ) d1 q1w                                                                                                                |
| 頭頸部がん  | weeklyDOC+radiation                   | ドセタキセル(10mg/m <sup>2</sup> ) d1 q1w                                                                                                                |
| 頭頸部がん  | weeklyPAC+セツキシマブ                      | セツキシマブ(初回400mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降250mg/m <sup>2</sup> ) d1+パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> ) d1 q1w                                                 |
| 頭頸部がん  | セツキシマブ(P1+5-FU+セツキシマブの7コース目以降用)       | セツキシマブ(250mg/m <sup>2</sup> ) d1 q1w                                                                                                               |
| 頭頸部がん  | セツキシマブ+radiation                      | セツキシマブ(初回400mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降250mg/m <sup>2</sup> ) d1 q1w                                                                                  |
| 頭頸部がん  | トラスツズマブ(DOC+トラスツズマブの7コース目以降)          | トラスツズマブ(6mg/kg) d1 q3w                                                                                                                             |
| 頭頸部がん  | ニボルマブ(2週間間隔)                          | ニボルマブ(240mg/body) d1 q2w                                                                                                                           |
| 頭頸部がん  | ニボルマブ(4週間間隔)                          | ニボルマブ(480mg/body) d1 q4w                                                                                                                           |
| 頭頸部がん  | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                       | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1 q3w                                                                                                                        |
| 頭頸部がん  | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                       | ベムプロリズマブ(400mg/body) d1 q6w                                                                                                                        |
| 乳がん    | AC                                    | ドキシルビシン(60mg/m <sup>2</sup> ) d1+シクロホスファミド(600mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                                           |
| 乳がん    | AC+ベムプロリズマブ                           | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1+ドキシルビシン(60mg/m <sup>2</sup> ) d1+エンドキサン(600mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                      |
| 乳がん    | CBDCa+GEM+ベムプロリズマブ                    | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1+GEM(1000mg/m <sup>2</sup> ) d1、8+カルボプラチン(AUC2・MAX300mg/body) d1、8 q3w                                                      |
| 乳がん    | CBDCa+PAC+ベムプロリズマブ                    | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1+パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15+カルボプラチン(AUC1.5・MAX225mg/body) d1、8、15 q3w                                            |
| 乳がん    | CPT-11(A法)                            | イリノタカン(100mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15 q4w                                                                                                          |
| 乳がん    | ddAC                                  | ドキシルビシン(60mg/m <sup>2</sup> ) d1+シクロホスファミド(600mg/m <sup>2</sup> ) d1 q2w                                                                           |
| 乳がん    | ddPAC                                 | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> ) d1 q2w                                                                                                              |
| 乳がん    | DOC                                   | ドセタキセル(75mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                                                                                |
| 乳がん    | DOC+CPA                               | ドセタキセル(75mg/m <sup>2</sup> ) d1+シクロホスファミド(600mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                                            |
| 乳がん    | GEM                                   | ゲムシタピン(1250mg/m <sup>2</sup> ) d1、8 q3w                                                                                                            |
| 乳がん    | HER+DOC+CPA                           | トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg) d1+ドセタキセル(75mg/m <sup>2</sup> ) d1+シクロホスファミド(600mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                           |
| 乳がん    | HER+PER 1コース目用                        | トラスツズマブ(600mg/body)・ペルツズマブ(1200mg/body) d1 q3w                                                                                                     |
| 乳がん    | HER+PER 2コース目以降用                      | トラスツズマブ(600mg/body)・ペルツズマブ(600mg/body) d1 q3w                                                                                                      |
| 乳がん    | HER+PER+DOC 1コース目用                    | トラスツズマブ(600mg/body)・ペルツズマブ(1200mg/body) d1+ドセタキセル(75mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                                     |
| 乳がん    | HER+PER+DOC 2コース目以降用                  | トラスツズマブ(600mg/body)・ペルツズマブ(600mg/body) d1+ドセタキセル(75mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                                      |
| 乳がん    | nab-PAC                               | ナブパクリタキセル(260mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                                                                            |
| 乳がん    | nab-PAC+アテゾリズマブ                       | アテゾリズマブ(840mg/body) d1、15+ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15 q4w                                                                             |
| 乳がん    | nab-PAC+ベムプロリズマブ                      | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1、22、43、64+ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15、29、36、43、57、64、71 q12w                                                   |
| 乳がん    | PAC(A法)                               | パクリタキセル(210mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                                                                              |
| 乳がん    | PAC(B法)                               | パクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15、22、29、36 q7w                                                                                                |
| 乳がん    | PAC+BV                                | パクリタキセル(90mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15+ベバシズマブ(10mg/kg) d1、15 q4w                                                                                    |
| 乳がん    | PAC+ベムプロリズマブ                          | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1、22、43、64+パクリタキセル(90mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15、29、36、43、57、64、71 q12w                                                      |
| 乳がん    | T-DM1                                 | トラスツズマブ エムタンシン(3.6mg/kg) d1 q3w                                                                                                                    |
| 乳がん    | VNR                                   | ビレリルビン(25mg/m <sup>2</sup> ) d1、8 q3w                                                                                                              |
| 乳がん    | weeklyPAC                             | パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15 q4w                                                                                                          |
| 乳がん    | エリブリン                                 | エリブリン(1.4mg/m <sup>2</sup> ) d1、8 q3w                                                                                                              |
| 乳がん    | カベシタピン+トラスツズマブ                        | カベシタピン(内服) d1タ15期+トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg) d1 q3w                                                                                             |
| 乳がん    | クラシカルCMF                              | メトトレキサート(40mg/m <sup>2</sup> ) d1、8+フルオロウラシル(600mg/m <sup>2</sup> ) d1、8+シクロホスファミド(内服100mg/m <sup>2</sup> ) d1-14 q4w                              |
| 乳がん    | サシズマブ+ゴビテカン                           | サシズマブ(10mg/kg) d1、8 q3w                                                                                                                            |
| 乳がん    | トラスツズマブ(triweekly)                    | トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg) d1 q3w                                                                                                               |
| 乳がん    | トラスツズマブ(triweekly)+PAC                | トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg) d1+パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15 q3w                                                                         |
| 乳がん    | トラスツズマブ(weekly)                       | トラスツズマブ(初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg) d1 q1w                                                                                                               |
| 乳がん    | トラスツズマブ(weekly)+PAC                   | トラスツズマブ(初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg) d1+パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> ) d1 q1w                                                                              |
| 乳がん    | トラスツズマブ+DOC                           | トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg) d1+ドセタキセル(75mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                                               |
| 乳がん    | トラスツズマブ+エリブリン                         | トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg) d1+エリブリン(1.4mg/m <sup>2</sup> ) d1、8 q3w                                                                             |
| 乳がん    | トラスツズマブ+デルクスデカン                       | トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg) d1+エリブリン(1.4mg/m <sup>2</sup> ) d1、8 q3w                                                                             |
| 乳がん    | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                       | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1 q3w                                                                                                                        |
| 乳がん    | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                       | ベムプロリズマブ(400mg/body) d1 q6w                                                                                                                        |
| 尿路上皮がん | GC 外来用                                | ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15+シスプラチン(70mg/m <sup>2</sup> ) d2 q4w                                                                         |
| 尿路上皮がん | GC 入院用                                | ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15+シスプラチン(70mg/m <sup>2</sup> ) d2 q4w                                                                         |
| 尿路上皮がん | GC+ニボルマブ                              | ニボルマブ(360mg/body) d1+ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> ) d1、8+シスプラチン(70mg/m <sup>2</sup> ) d1 q3w                                                       |
| 尿路上皮がん | G-Carbo                               | ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> ) d1、8+カルボプラチン(AUC4.5・MAX675mg/body) d1 q3w                                                                           |
| 尿路上皮がん | G-Carbo+ニボルマブ                         | ニボルマブ(360mg/body) d1+ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> ) d1、8+カルボプラチン(AUC4.5orAUC5・MAX750mg/body) d1 q3w                                                |
| 尿路上皮がん | GP                                    | ゲムシタピン(2500mg/m <sup>2</sup> ) d1+パクリタキセル(150mg/m <sup>2</sup> ) d1 q2w                                                                            |
| 尿路上皮がん | M-VAC                                 | メトトレキサート(30mg/m <sup>2</sup> ) d1、15、22+ビンブラスチン(3mg/m <sup>2</sup> ) d2、15、22+ドキシルビシン(30mg/m <sup>2</sup> ) d2+シスプラチン(70mg/m <sup>2</sup> ) d2 q4w |
| 尿路上皮がん | weeklyCBDCa+PAC                       | パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC2・MAX300mg/body) d1 q1w                                                                                |
| 尿路上皮がん | アベルマブ                                 | アベルマブ(10mg/kg) d1 q2w                                                                                                                              |
| 尿路上皮がん | エンホルツマブ ベドチン                          | エンホルツマブ ベドチン(1.25mg/kg・MAX125mg/body) d1、8、15 q4w                                                                                                  |
| 尿路上皮がん | ニボルマブ(2週間間隔)                          | ニボルマブ(240mg/body) d1 q2w                                                                                                                           |
| 尿路上皮がん | ニボルマブ(4週間間隔)                          | ニボルマブ(480mg/body) d1 q4w                                                                                                                           |
| 尿路上皮がん | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                       | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1 q3w                                                                                                                        |
| 尿路上皮がん | ベムプロリズマブ(3週間間隔)+エンホルツマブ ベドチン          | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1+エンホルツマブ ベドチン(1.25mg/kg・MAX125mg/body) d1、8 q3w                                                                             |
| 尿路上皮がん | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                       | ベムプロリズマブ(400mg/body) d1 q6w                                                                                                                        |
| 尿路上皮がん | ベムプロリズマブ(6週間間隔)+エンホルツマブ ベドチン          | ベムプロリズマブ(400mg/body) d1+エンホルツマブ ベドチン(1.25mg/kg・MAX125mg/body) d1、8、22、29 q6w                                                                       |
| 脳腫瘍    | BV(再発)                                | ベバシズマブ(10mg/kg) d1 q2w                                                                                                                             |
| 脳腫瘍    | BV(初発単剤療法期)                           | ベバシズマブ(15mg/kg) d1 q3w                                                                                                                             |
| 脳腫瘍    | BV+TMZ(TMZ内服)(初発維持療法期)                | ベバシズマブ(10mg/kg) d1、15+テモゾロミド(150mg/m <sup>2</sup> or 200mg/m <sup>2</sup> ) d1-5 q4w                                                               |
| 脳腫瘍    | BV+TMZ(初発維持療法期)                       | ベバシズマブ(10mg/kg) d1、15+テモゾロミド(150mg/m <sup>2</sup> or 200mg/m <sup>2</sup> ) d1-5 q4w                                                               |
| 脳腫瘍    | BV+TMZ+RT(TMZ内服)(初発放射線併用期)            | ベバシズマブ(10mg/kg) d1、15、29、42+テモゾロミド(内服75mg/m <sup>2</sup> ) d1-42 q10w                                                                              |
| 脳腫瘍    | BV+TMZ+RT(初発放射線併用期)                   | ベバシズマブ(10mg/kg) d1、15、29、42+テモゾロミド(75mg/m <sup>2</sup> ) d1-42 q10w                                                                                |
| 脳腫瘍    | MCNU                                  | ラニムスチン(80mg/m <sup>2</sup> ) d1 q6w                                                                                                                |
| 脳腫瘍    | PAV                                   | ニムスチン(70mg/m <sup>2</sup> ) d1+ビンクリスチン(1.4mg/m <sup>2</sup> ・MAX2mg/body) d8、29+プロカルバジン(100mg/body) d8-21 q8w                                      |
| 脳腫瘍    | TMZ(初発維持療法期・再発)                       | テモゾロミド(150mg/m <sup>2</sup> or 200mg/m <sup>2</sup> ) d1-5 q4w                                                                                     |
| 脳腫瘍    | TMZ+RT(初発放射線併用期)                      | テモゾロミド(75mg/m <sup>2</sup> ) d1-42 q10w                                                                                                            |
| 肺がん    | CBDCa+nab-PAC+アテゾリズマブ                 | アテゾリズマブ(1200mg/body) d1+ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body) d1 q3w                                                |
| 肺がん    | CBDCa+Pem+オシメルチニブ                     | オシメルチニブ(500mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body) d1+オシメルチニブ(80mg/body) d1-21 q3w                                                      |
| 肺がん    | CDDP+Pem+オシメルチニブ                      | オシメルチニブ(500mg/m <sup>2</sup> ) d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> ) d1+オシメルチニブ(80mg/body) d1-21 q3w                                                     |
| 肺がん    | Pem+オシメルチニブ(維持療法)                     | オシメルチニブ(500mg/m <sup>2</sup> ) d1+オシメルチニブ(80mg/body) d1-21 q3w                                                                                     |
| 肺がん    | AMR                                   | アムルビシン(40mg/m <sup>2</sup> ) d1-3 q3~4w                                                                                                            |
| 肺がん    | BV(維持療法)                              | ベバシズマブ(15mg/kg) d1 q3w                                                                                                                             |
| 肺がん    | CBDCa+CPT-11                          | イリノタカン(60mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body) d1 q4w                                                                            |
| 肺がん    | CBDCa+DOC                             | ドセタキセル(70mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body) d1 q3w                                                                                 |
| 肺がん    | CBDCa+GEM                             | ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> ) d1、8+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body) d1 q3w                                                                             |
| 肺がん    | CBDCa+GEM+デュルバルマブ+トレメリマブ              | デュルバルマブ(75mg/body) d1+デュルバルマブ(1500mg/body) d1+ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> ) d1、8+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body) d1 q3w                         |
| 肺がん    | CBDCa+nab-PAC                         | ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body) d1 q3w                                                                        |
| 肺がん    | CBDCa+nab-PAC+デュルバルマブ+トレメリマブ          | デュルバルマブ(75mg/body) d1+デュルバルマブ(1500mg/body) d1+ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body) d1 q3w                    |
| 肺がん    | CBDCa+nab-PAC+ベムプロリズマブ                | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1+ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> ) d1、8、15+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body) d1 q3w                                                |
| 肺がん    | CBDCa+PAC                             | パクリタキセル(200mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body) d1 q3w                                                                               |
| 肺がん    | CBDCa+PAC+BV                          | パクリタキセル(200mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body) d1+ベバシズマブ(15mg/kg) d1 q3w                                                            |
| 肺がん    | CBDCa+PAC+BV+アテゾリズマブ                  | アテゾリズマブ(1200mg/body) d1+ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body) d1 q3w                                                     |
| 肺がん    | CBDCa+PAC+ベムプロリズマブ                    | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1+パクリタキセル(200mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body) d1 q3w                                                       |
| 肺がん    | CBDCa+Pem+BV                          | ベバシズマブ(15mg/kg) d1+オシメルチニブ(500mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body) d1 q3w                                                            |
| 肺がん    | CBDCa+Pem+アミバンタマブ 1コース目用 80kg以上       | アミバンタマブ(350mg/body) d1+アミバンタマブ(1400mg/body) d2+アミバンタマブ(1750mg/body) d8、15+オシメルチニブ(500mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body) d1 q3w     |
| 肺がん    | CBDCa+Pem+アミバンタマブ 1コース目用 80kg未満       | アミバンタマブ(350mg/body) d1+アミバンタマブ(1050mg/body) d2+アミバンタマブ(1400mg/body) d8、15+オシメルチニブ(500mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body) d1 q3w     |
| 肺がん    | CBDCa+Pem+アミバンタマブ 2コース目用 80kg以上       | アミバンタマブ(1750mg/body) d1+オシメルチニブ(500mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body) d1 q3w                                                       |
| 肺がん    | CBDCa+Pem+アミバンタマブ 2コース目用 80kg未満       | アミバンタマブ(1400mg/body) d1+オシメルチニブ(500mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body) d1 q3w                                                       |
| 肺がん    | CBDCa+Pem+アミバンタマブ 3コース目・4コース目用 80kg未満 | アミバンタマブ(1750mg/body) d1+オシメルチニブ(500mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body) d1 q3w                                                       |
| 肺がん    | CBDCa+Pem+アミバンタマブ 3コース目・4コース目用 80kg以上 | アミバンタマブ(2100mg/body) d1+オシメルチニブ(500mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body) d1 q3w                                                       |
| 肺がん    | CBDCa+Pem+デュルバルマブ+トレメリマブ              | デュルバルマブ(75mg/body) d1+デュルバルマブ(1500mg/body) d1+オシメルチニブ(500mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body) d1 q3w                           |
| 肺がん    | CBDCa+Pem+ベムプロリズマブ                    | ベムプロリズマブ(200mg/body) d1+オシメルチニブ(500mg/m <sup>2</sup> ) d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body) d1 q3w                                                       |

| がん種           | レジメン名                                            | レジメン内容(一般名)                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 肺がん           | CBDCA+S1                                         | カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+S1(内服)d1-14 q3w                                                                              |
| 肺がん           | CBDCA+VNR                                        | ビレルビン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3w                                                         |
| 肺がん           | CBDCA+VP-16                                      | エトボシド(80mg/m <sup>2</sup> or100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3~4w                                 |
| 肺がん           | CBDCA+VP-16+RTx                                  | エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3~4w                                                       |
| 肺がん           | CBDCA+VP-16+アテゾリズマブ                              | アテゾリズマブ(1200mg/body)d1+エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3w                                  |
| 肺がん           | CBDCA+VP-16+デュルバルマブ                              | デュルバルマブ(1500mg/body)d1+エトボシド(80mg/m <sup>2</sup> or 100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+カルボプラチン(AUC5)d1 q3w                         |
| 肺がん           | CDDP+CPT-11                                      | イリノテカン(60mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q4w                                                   |
| 肺がん           | CDDP+CPT-11(short hydration)                     | イリノテカン(60mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q4w                                                   |
| 肺がん           | CDDP+DOC                                         | ドセタキセル(70mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                          |
| 肺がん           | CDDP+DOC(short hydration)                        | ドセタキセル(70mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                          |
| 肺がん           | CDDP+DOC+RTx(short hydration)                    | ドセタキセル(40mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(40mg/m <sup>2</sup> )d1, 8 q4w                                                    |
| 肺がん           | CDDP+GEM                                         | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                     |
| 肺がん           | CDDP+GEM(short hydration)                        | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                     |
| 肺がん           | CDDP+GEM+BV                                      | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1+ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                   |
| 肺がん           | CDDP+GEM+BV (short hydration)                    | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1+ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                   |
| 肺がん           | CDDP+GEM+デュルバルマブ+トレメリマブ                          | トレメリマブ(75mg/body)d1+デュルバルマブ(1500mg/body)d1+ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w          |
| 肺がん           | CDDP+Gem+BV(short hydration)                     | ベバシズマブ(15mg/kg)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                      |
| 肺がん           | CDDP+Gem+デュルバルマブ+トレメリマブ                          | トレメリマブ(75mg/body)d1+デュルバルマブ(1500mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w             |
| 肺がん           | CDDP+Gem+ベムプロリズマブ                                | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                 |
| 肺がん           | CDDP+S1                                          | シスプラチン(60mg/m <sup>2</sup> )d8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1-21 q4~5w                                                     |
| 肺がん           | CDDP+S1(short hydration)                         | シスプラチン(60mg/m <sup>2</sup> )d8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1-21 q4~5w                                                     |
| 肺がん           | CDDP+VNR                                         | ビレルビン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                        |
| 肺がん           | CDDP+VNR(CDDP分割)                                 | ビレルビン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(40mg/m <sup>2</sup> )d1, 8 q3w                                                     |
| 肺がん           | CDDP+VNR(short hydration)                        | ビレルビン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(90mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                        |
| 肺がん           | CDDP+VP-16                                       | エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3~4w                                                      |
| 肺がん           | CDDP+VP-16(short hydration)                      | エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3~4w                                                      |
| 肺がん           | CDDP+VP-16+RTx                                   | エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3~4w                                                      |
| 肺がん           | CDDP+VP-16+デュルバルマブ                               | デュルバルマブ(1500mg/body)d1+エトボシド(80mg/m <sup>2</sup> or100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body)d1 q3w      |
| 肺がん           | CPT-11                                           | イリノテカン(100mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                 |
| 肺がん           | CPT-11+S1                                        | イリノテカン(80mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1-14 q3~4w                                                  |
| 肺がん           | DOC                                              | ドセタキセル(70mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                                                         |
| 肺がん           | GEM                                              | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                |
| 肺がん           | GEM+VNR                                          | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+ビレルビン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 8 q3w                                                   |
| 肺がん           | nab-PAC                                          | ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q3w                                                                              |
| 肺がん           | NGT                                              | ノキテカン(1mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q3w                                                                                         |
| 肺がん           | NGT+PAC                                          | ノキテカン(1.75mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+パクリタキセル(70mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                          |
| 肺がん           | Pem+BV(維持療法)                                     | ベバシズマブ(15mg/kg)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                                     |
| 肺がん           | Pem+アミバンタマブ CBDCA+Pem+アミバンタマブ5コース目以降用 80kg以上     | アミバンタマブ(2100mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                                |
| 肺がん           | Pem+アミバンタマブ CBDCA+Pem+アミバンタマブ5コース目以降用 80kg未満     | アミバンタマブ(1750mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                                |
| 肺がん           | Pem+デュルバルマブ(維持療法)                                | デュルバルマブ(1500mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1 q4w                                                                |
| 肺がん           | Pem+デュルバルマブ+トレメリマブ(Durva+Treme+Pt+Pemの5, 6コース目用) | トレメリマブ(75mg/body)d29+デュルバルマブ(1500mg/body)d1, 29+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1, 29 q8w                                   |
| 肺がん           | Pem+ベムプロリズマブ(維持療法)                               | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                                |
| 肺がん           | RAM+DOC                                          | ラムシルマブ(10mg/kg)d1+ドセタキセル(60mg/m <sup>2</sup> or 75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                |
| 肺がん           | SPE                                              | エトボシド(80mg/m <sup>2</sup> )d1-3+シスプラチン(25mg/m <sup>2</sup> )d1-3 q3~4w                                                     |
| 肺がん           | VNR                                              | ビレルビン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                   |
| 肺がん           | weeklyTC+RTx                                     | パクリタキセル(40mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC2・MAX300mg/body)d1 q1w                                                          |
| 肺がん           | アテゾリズマブ                                          | アテゾリズマブ(1200mg/body)d1 q3w                                                                                                 |
| 肺がん           | アテゾリズマブ                                          | アテゾリズマブ(1200mg/body)d1 q3w                                                                                                 |
| 肺がん           | アテゾリズマブ+BV(維持療法)                                 | アテゾリズマブ(1200mg/body)d1+ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                                               |
| 肺がん           | エルロチニブ+BV                                        | ベバシズマブ(15mg/kg)d1+エルロチニブ(150mg/body)d1-21 q3w                                                                              |
| 肺がん           | エルロチニブ+RAM                                       | ラムシルマブ(10mg/kg)d1+エルロチニブ(150mg/body)d1-14 q2w                                                                              |
| 肺がん           | ゲフィチニブ+BV                                        | ベバシズマブ(15mg/kg)d1+ゲフィチニブ(250mg/body)d1-21 q3w                                                                              |
| 肺がん           | ゲフィチニブ+RAM                                       | ラムシルマブ(10mg/kg)d1+ゲフィチニブ(250mg/body)d1-14 q2w                                                                              |
| 肺がん           | デュルバルマブ(維持療法)                                    | デュルバルマブ(1500mg/body)d1 q4w                                                                                                 |
| 肺がん           | デュルバルマブ+トレメリマブ(Durva+Treme+Pt+Chemoの5, 6コース目用)   | トレメリマブ(75mg/body)d29+デュルバルマブ(1500mg/body)d1, 29 q8w                                                                        |
| 肺がん           | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                                  | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                 |
| 肺がん           | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                                  | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                 |
| 肺がん(非扁平上皮がん)  | CBDCA+Pem+ニボルマブ+イビリムマブ                           | ニボルマブ(360mg/body)d1, 22+イビリムマブ(1mg/kg)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1, 22+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body)d1, 22 q6w  |
| 肺がん(非扁平上皮がん)  | CDDP+Pem+ニボルマブ+イビリムマブ                            | ニボルマブ(360mg/body)d1, 22+イビリムマブ(1mg/kg)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1, 22+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1, 22 q6w       |
| 肺がん(扁平上皮がん)   | CBDCA+PAC+ニボルマブ+イビリムマブ                           | ニボルマブ(360mg/body)d1, 22+イビリムマブ(1mg/kg)d1+パクリタキセル(200mg/m <sup>2</sup> )d1, 22+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1, 22 q6w        |
| 肺がん・悪性胸膜中皮腫   | CBDCA+Pem                                        | ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                                                   |
| 肺がん・悪性胸膜中皮腫   | CDDP+Pem                                         | ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                        |
| 肺がん・悪性胸膜中皮腫   | CDDP+Pem(short hydration)                        | ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                        |
| 肺がん・悪性胸膜中皮腫   | Pem                                              | ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                                                       |
| 肺がん・悪性胸膜中皮腫   | ニボルマブ(2週間間隔)                                     | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                    |
| 肺がん・悪性胸膜中皮腫   | ニボルマブ(2週間間隔)+イビリムマブ                              | ニボルマブ(240mg/body)d1, 15, 29+イビリムマブ(1mg/kg)d1 q6w                                                                           |
| 肺がん・悪性胸膜中皮腫   | ニボルマブ(3週間間隔)+イビリムマブ                              | ニボルマブ(360mg/body)d1, 22+イビリムマブ(1mg/kg)d1 q6w                                                                               |
| 肺がん・悪性胸膜中皮腫   | ニボルマブ(4週間間隔)                                     | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                    |
| 皮膚がん          | PEP                                              | ペブロマイシン(10mg/body)d1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29, 32 q5w                                                                 |
| 副腎がん          | EDP-M                                            | ドキシソルピシン(40mg/m <sup>2</sup> )d1+エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d2-4+シスプラチン(40mg/m <sup>2</sup> )d2, 3+ミトタン(内服)d1-28 q4w      |
| 膀胱がん          | BCG40mg膀胱内注入                                     | BCG(40mg/body)d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 q8w                                                                            |
| 膀胱がん          | BCG40mg膀胱内注入 単回用                                 | BCG(40mg/body)d1 q1w                                                                                                       |
| 膀胱がん          | BCG80mg膀胱内注入                                     | BCG(80mg/body)d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 q8w                                                                            |
| 膀胱がん          | MMC膀胱内注入                                         | マイトマイシンC(30mg/body)d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64 q10w                                                              |
| 膀胱がん          | THP膀胱内注入                                         | ビラルビジン(30mg/body)d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64 q10w                                                                |
| 膀胱がん          | THP膀胱内注入 OPE用                                    | ビラルビジン(30mg/body)d1 q1w                                                                                                    |
| 慢性白血病         | FCR(1コース目)                                       | リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1+シクロホスファミド(250mg/m <sup>2</sup> )d2-4+フルダリン(25mg/m <sup>2</sup> )d2-4 q4w                   |
| 慢性白血病         | FCR(2コース目以降)                                     | リツキシマブ(500mg/m <sup>2</sup> )d1+シクロホスファミド(250mg/m <sup>2</sup> )d2-4+フルダリン(25mg/m <sup>2</sup> )d2-4 q4w                   |
| 慢性白血病         | RCD                                              | リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1+シクロホスファミド(750mg/m <sup>2</sup> )d2+デキサメタゾン(点滴静注9.9mg/body or 内服12mg/body)d1-7 q4w          |
| ユーイング肉腫       | IE                                               | エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-5+イホスファミド(1800mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q2w                                                   |
| ユーイング肉腫       | VDC                                              | ビンクリスチン(2.0mg/m <sup>2</sup> ・MAX2mg/body)d1+シクロホスファミド(1200mg/m <sup>2</sup> )d1+ドキシソルピシン(37.5mg/m <sup>2</sup> )d1, 2 q2w |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | VBL+PSL(LCH Group3 維持療法)                         | ビンブラスチン(6mg/m <sup>2</sup> )d1+ブレドニソロン(40mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q3w                                                       |
| 卵巣がん          | BV(維持療法)                                         | ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                                                                      |
| 卵巣がん          | CPT-11(A法)                                       | イリノテカン(100mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                 |
| 卵巣がん          | CPT-P                                            | イリノテカン(60mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+シスプラチン(60mg/m <sup>2</sup> )d1 q4w                                                   |
| 卵巣がん          | DC                                               | ドセタキセル(70mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3~4w                                                         |
| 卵巣がん          | dose-denseTC                                     | パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3~4w                                                 |
| 卵巣がん          | GEM                                              | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                |
| 卵巣がん          | GEM+BV                                           | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                                  |
| 卵巣がん          | GEM+CBDCA                                        | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+カルボプラチン(AUC4・MAX600mg/body)d1 q3w                                                      |
| 卵巣がん          | NGT                                              | ノキテカン(1.5mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q3w                                                                                       |
| 卵巣がん          | NGT+BV                                           | ノキテカン(1.25mg/m <sup>2</sup> )d1-5+ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                                    |
| 卵巣がん          | PLD                                              | ドキシソルピシン塩酸塩リボソーム(40mg/m <sup>2</sup> )d1 q4w                                                                               |
| 卵巣がん          | PLD+BV                                           | ドキシソルピシン塩酸塩リボソーム(40mg/m <sup>2</sup> )d1+ベバシズマブ(10mg/kg)d1, 15 q4w                                                         |
| 卵巣がん          | PLD+CBDCA                                        | ドキシソルピシン塩酸塩リボソーム(30mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q4w                                                 |
| 卵巣がん          | PLD+CBDCA+BV                                     | ドキシソルピシン塩酸塩リボソーム(30mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+ベバシズマブ(10mg/kg)d1, 15 q4w                           |
| 卵巣がん          | TC                                               | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                                                         |
| 卵巣がん          | TC+BV                                            | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1+ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                       |
| 卵巣がん          | TP                                               | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                        |
| 卵巣がん          | TP+BV                                            | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1+ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                      |
| 卵巣がん          | weeklyPAC                                        | パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                 |
| 卵巣がん          | weeklyTC                                         | パクリタキセル(60mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC2・MAX300mg/body)d1 q1w                                                          |
| 卵巣胚細胞腫瘍       | BEP                                              | フルオマイシン(30mg/body)d2, 9, 16+エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-5+シスプラチン(20mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q3w                          |
| 卵巣胚細胞腫瘍       | TIP                                              | パクリタキセル(210mg/m <sup>2</sup> )d1+イホスファミド(1200mg/m <sup>2</sup> )d2-6+シスプラチン(20mg/m <sup>2</sup> )d2-6 q3w                  |