

| がん種          | レジメン名                                 | レジメン内容(一般名)                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 黄色の行は今回更新分です |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MSI-High固形がん | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                       | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                          |
| MSI-High固形がん | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                       | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                                                                                                                                          |
| TMB-High固形がん | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                       | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                          |
| TMB-High固形がん | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                       | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                                                                                                                                          |
| 悪性軟部腫瘍       | DXR                                   | ドキシソルピシン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                                                                                                                                                                                |
| 悪性軟部腫瘍       | エリブリン                                 | エリブリン(1.4mg/m <sup>2</sup> )d1, 8 q3w                                                                                                                                                                                                               |
| 悪性リンパ腫       | VR-CAP療法                              | ドキシソルピシン(50mg/m <sup>2</sup> )d1+シクロホスファミド(750mg/m <sup>2</sup> )d1+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1, 4, 8, 11+ブレドニゾロン(60mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q3w                                                                                                 |
| 悪性リンパ腫       | V-GAP療法                               | リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1+ドキシソルピシン(50mg/m <sup>2</sup> )d1+シクロホスファミド(750mg/m <sup>2</sup> )d1+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1, 4, 8, 11+ブレドニゾロン(60mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q3w                                                                 |
| 悪性リンパ腫       | A+AVD                                 | ブレントキシマブベドチン(1.2mg/kg)d1, 15+ドキシソルピシン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 15+ビンブラスチン(6mg/m <sup>2</sup> )d1, 15+ダカルバジン(375mg/m <sup>2</sup> )d1, 15 q4w                                                                                                        |
| 悪性リンパ腫       | A+CHP                                 | ブレントキシマブベドチン(1.8mg/kg)d1+シクロホスファミド(750mg/m <sup>2</sup> )d1+ドキシソルピシン(50mg/m <sup>2</sup> )d1+ブレドニゾロン(60mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q3w                                                                                                                  |
| 悪性リンパ腫       | ABVD                                  | ドキシソルピシン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 15+ブレオマイシン(10mg/m <sup>2</sup> )d1, 15+ビンブラスチン(6mg/m <sup>2</sup> )d1, 15+ダカルバジン(375mg/m <sup>2</sup> )d1, 15 q4w                                                                                                 |
| 悪性リンパ腫       | BEACOPPbaseline                       | エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+ドキシソルピシン(25mg/m <sup>2</sup> )d1+シクロホスファミド(650mg/m <sup>2</sup> )d1+ビンクリスチン(1.4mg/m <sup>2</sup> )d8+ブレオマイシン(10mg/m <sup>2</sup> )d8+ブレドニゾロン(40mg/m <sup>2</sup> )d1-14+プロカルバジン(100mg/m <sup>2</sup> )d1-7 q3w     |
| 悪性リンパ腫       | Brentuximab Vedotin                   | ブレントキシマブベドチン(1.8mg/kg)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                        |
| 悪性リンパ腫       | Dose escalated BEACOPP                | エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )×2 d1-3+ドキシソルピシン(35mg/m <sup>2</sup> )d1+シクロホスファミド(1250mg/m <sup>2</sup> )d1+ビンクリスチン(1.4mg/m <sup>2</sup> )d8+ブレオマイシン(10mg/m <sup>2</sup> )d8+ブレドニゾロン(40mg/m <sup>2</sup> )d1-14+プロカルバジン(100mg/m <sup>2</sup> )d1-7 q3w |
| 悪性リンパ腫       | Epcoritamab(10コース目以降)                 | エポコリタマブ(48mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                            |
| 悪性リンパ腫       | Epcoritamab(1コース目)                    | エポコリタマブ(0.16mg/body)d1+エポコリタマブ(0.8mg/body)d8+エポコリタマブ(48mg/body)d15, 22 q4w                                                                                                                                                                          |
| 悪性リンパ腫       | Epcoritamab(2, 3コース目)                 | エポコリタマブ(48mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                                                                                                                                                                                                                 |
| 悪性リンパ腫       | Epcoritamab(4~9コース目)                  | エポコリタマブ(48mg/body)d1, 15 q4w                                                                                                                                                                                                                        |
| 悪性リンパ腫       | GDP±R                                 | ゲムタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, d8+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1+リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d8+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1-4 q3w                                                                                                    |
| 悪性リンパ腫       | mGDP±R                                | ゲムタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+カルボプラチン(AUC5)d1+リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d8+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1-4 q3w                                                                                                                    |
| 悪性リンパ腫       | Pola-BR(1コース目)                        | リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1+ボラツズマブベドチン(1.8mg/kg)d2+ベンダムスチン(90mg/m <sup>2</sup> )d2, 3 q3w                                                                                                                                                       |
| 悪性リンパ腫       | Pola-BR(2~6コース目)                      | リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1+ボラツズマブベドチン(1.8mg/kg)d1+ベンダムスチン(90mg/m <sup>2</sup> )d1, 2 q3w                                                                                                                                                       |
| 悪性リンパ腫       | Pola-R-CHP                            | リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1+ボラツズマブベドチン(1.8mg/kg)d1+ドキシソルピシン(50mg/m <sup>2</sup> )d1+シクロホスファミド(750mg/m <sup>2</sup> )d1+ブレドニゾロン(60mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q3w                                                                                    |
| 悪性リンパ腫       | POMP                                  | ビンクリスチン(2mg/body)d1+ブレドニゾロン(内服200mg/body)d1-5+メトトレキサート(内服20mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15, 22+メルカプトプリン(内服150mg/body)d1-28 q4w                                                                                                                         |
| 悪性リンパ腫       | R*2 (R square)(1コース目)                 | リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15, 22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                                                                                                                             |
| 悪性リンパ腫       | R*2 (R square)(2~5コース目)               | リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                                                                                                                                        |
| 悪性リンパ腫       | R-BAC                                 | リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1+ベンダムスチン(70mg/m <sup>2</sup> )d2, 3+シタラビン(800mg/m <sup>2</sup> )d2, 3, 4 q4w                                                                                                                                         |
| 悪性リンパ腫       | R-Bendamustine                        | ベンダムスチン(90mg/m <sup>2</sup> )d1, 2+リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1 q4w                                                                                                                                                                              |
| 悪性リンパ腫       | R-CEOP                                | リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1+エトボシド(60mg/m <sup>2</sup> )d1+ビンクリスチン(1.4mg/m <sup>2</sup> )d1+シクロホスファミド(750mg/m <sup>2</sup> )d1+ブレドニゾロン(60mg/m <sup>2</sup> )d1-5+エトボシド(内服100mg/m <sup>2</sup> )d2, 3 q3w                                         |
| 悪性リンパ腫       | R-VD                                  | ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1, 4, 8, 11+リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1-4 q3w                                                                                                                             |
| 悪性リンパ腫       | ニボルマブ(2週間間隔)                          | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                             |
| 悪性リンパ腫       | ニボルマブ(4週間間隔)                          | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                             |
| 悪性リンパ腫       | プラトレキサート                              | プラトレキサート(30mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15, 22, 29 q7w                                                                                                                                                                                                 |
| 悪性リンパ腫       | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                       | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                          |
| 悪性リンパ腫       | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                       | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                                                                                                                                          |
| 悪性リンパ腫       | リツキシマブ                                | リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1 q1w                                                                                                                                                                                                                 |
| 悪性リンパ腫       | ロミデプシン                                | ロミデプシン(14mg/m <sup>2</sup> )d1, 15 q4w                                                                                                                                                                                                              |
| 悪性黒色腫        | ニボルマブ(2週間間隔)(ニボルマブ+イビリムマブの5コース目以降)    | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                             |
| 悪性黒色腫        | ニボルマブ(4週間間隔)(ニボルマブ+イビリムマブの5コース目以降)    | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                             |
| 悪性黒色腫        | ニボルマブ+イビリムマブ                          | ニボルマブ(80mg/body)d1+イビリムマブ(3mg/kg)d1 q3w                                                                                                                                                                                                             |
| 胃がん          | CapeOX                                | オキサリプラチン(130mg/m <sup>2</sup> )d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                             |
| 胃がん          | CapeOX+トラスツズマブ 1コース目用                 | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg)d1+オキサリプラチン(130mg/m <sup>2</sup> )d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                            |
| 胃がん          | CapeOX+トラスツズマブ 2コース目以降用               | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg)d1+オキサリプラチン(130mg/m <sup>2</sup> )d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                            |
| 胃がん          | CapeOX+ニボルマブ                          | ニボルマブ(360mg/body)d1+オキサリプラチン(130mg/m <sup>2</sup> )d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                         |
| 胃がん          | ODDP+S1 外来用                           | シスプラチン(60mg/m <sup>2</sup> )d8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1-21 q4~5w                                                                                                                                                                              |
| 胃がん          | ODDP+S1 入院用                           | シスプラチン(60mg/m <sup>2</sup> )d8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1-21 q4~5w                                                                                                                                                                              |
| 胃がん          | OPT-11(A法)                            | イリノテカン(100mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                                                                                                                                          |
| 胃がん          | OPT-11(biweekly)                      | イリノテカン(150mg/m <sup>2</sup> )d1 q2w                                                                                                                                                                                                                 |
| 胃がん          | OPT-11+ODDP                           | イリノテカン(60mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(30mg/m <sup>2</sup> )d1 q2w                                                                                                                                                                                   |
| 胃がん          | OPT-11+ODDP(High dose)                | イリノテカン(70mg/m <sup>2</sup> )d1, 15+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q4w                                                                                                                                                                               |
| 胃がん          | DOC                                   | ドセタキセル(60mg/m <sup>2</sup> )d1 q3~4w                                                                                                                                                                                                                |
| 胃がん          | DS                                    | ドセタキセル(40mg/m <sup>2</sup> )d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                              |
| 胃がん          | FP+トラスツズマブ 1コース目用                     | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg)d1+フルオロウシル(4000mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                                                                                                               |
| 胃がん          | FP+トラスツズマブ 2コース目以降用                   | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg)d1+フルオロウシル(4000mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                                                                                                               |
| 胃がん          | G-SOX                                 | オキサリプラチン(100mg/m <sup>2</sup> )d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                           |
| 胃がん          | mFOLFOX6                              | オキサリプラチン(85mg/m <sup>2</sup> )d1+レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウシル(bolus400mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウシル(2400mg/m <sup>2</sup> 46hrs)d1 q2w                                                                                                  |
| 胃がん          | mFOLFOX6+ニボルマブ                        | ニボルマブ(240mg/body)d1+オキサリプラチン(85mg/m <sup>2</sup> )d1+レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウシル(bolus400mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウシル(2400mg/m <sup>2</sup> 46hrs)d1 q2w                                                                              |
| 胃がん          | MTX、5-FU交代療法                          | メトトレキサート(100mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウシル(600mg/m <sup>2</sup> )d1 q1~2w                                                                                                                                                                            |
| 胃がん          | nab-PAC                               | ナブパクリタキセル(260mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                                                                                                                                                                              |
| 胃がん          | nab-PAC+RAM                           | ラムシルマブ(8mg/kg)d1, 15+ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                                                                                                                  |
| 胃がん          | RAM                                   | ラムシルマブ(8mg/kg)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                                |
| 胃がん          | SOX+ニボルマブ(L-OHP100mg/m <sup>2</sup> ) | ニボルマブ(360mg/body)d1+オキサリプラチン(100mg/m <sup>2</sup> )d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                       |
| 胃がん          | SOX+ニボルマブ(L-OHP130mg/m <sup>2</sup> ) | ニボルマブ(360mg/body)d1+オキサリプラチン(130mg/m <sup>2</sup> )d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                       |
| 胃がん          | weeklyPAC                             | パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                                                                                                                                          |
| 胃がん          | weeklyPAC+RAM                         | ラムシルマブ(8mg/kg)d1, 15+パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                                                                                                                     |
| 胃がん          | XP                                    | シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                                |
| 胃がん          | XP+トラスツズマブ 1コース目用                     | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg)d1+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                               |
| 胃がん          | XP+トラスツズマブ 2コース目以降用                   | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg)d1+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                               |
| 胃がん          | XP+トラスツズマブ 外来2コース目以降用                 | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg)d1+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                               |
| 胃がん          | XP+トラスツズマブ(ODDPなし) 1コース目用             | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg)d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                              |
| 胃がん          | XP+トラスツズマブ(ODDPなし) 2コース目以降用           | トラスツズマブ(初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg)d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                                              |
| 胃がん          | トラスツズマブデルクステカン                        | トラスツズマブデルクステカン(6.4mg/kg)d1 q3w                                                                                                                                                                                                                      |
| 胃がん          | ニボルマブ(2週間間隔)                          | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                             |
| 胃がん          | ニボルマブ(4週間間隔)                          | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                             |
| 胃がん          | CapeOX+ベムプロリズマブ                       | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+オキサリプラチン(130mg/m <sup>2</sup> )d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                                                                                                      |
| 陰茎がん         | TIP                                   | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+イホスファミド(1200mg/m <sup>2</sup> )d1-3+シスプラチン(25mg/m <sup>2</sup> )d1-3 q3~4w                                                                                                                                         |
| 肝臓がん         | low dose FP                           | シスプラチン(7mg/m <sup>2</sup> )d1-5+フルオロウシル(170mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q1w                                                                                                                                                                              |
| 褐色細胞腫        | CVD 外来用                               | シクロホスファミド(750mg/m <sup>2</sup> )d1+ビンクリスチン(1.4mg/m <sup>2</sup> )d1+MAX2mg/bodyd1+ダカルバジン(600mg/m <sup>2</sup> )d1, 2 q3~4w                                                                                                                          |
| 褐色細胞腫        | CVD 入院用                               | シクロホスファミド(750mg/m <sup>2</sup> )d1+ビンクリスチン(1.4mg/m <sup>2</sup> )d1+MAX2mg/bodyd1+ダカルバジン(600mg/m <sup>2</sup> )d1, 2 q3~4w                                                                                                                          |
| 肝芽腫          | VI                                    | ビンクリスチン(1.5mg/m <sup>2</sup> )d1+MAX2mg/bodyd1+イリノテカン(50mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q3w                                                                                                                                                                 |
| 肝臓がん         | ODDP+5-FU肝動注 1コース目・2コース目用             | シスプラチン(50mg/body)d1+フルオロウシル(bolus250mg/body)d1+フルオロウシル(1250mg/body120hrs)d1 q1w                                                                                                                                                                     |
| 肝臓がん         | ODDP+5-FU肝動注 3コース目以降用                 | シスプラチン(20mg/body)d1+フルオロウシル(1250mg/body120hrs)d1 q2w                                                                                                                                                                                                |
| 肝臓がん         | ODDP肝動注                               | シスプラチン(50mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                             |
| 肝臓がん         | DXR肝動注                                | ドキシソルピシン(30mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                           |
| 肝臓がん         | RAM                                   | ラムシルマブ(8mg/kg)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                                |
| 肝臓がん         | アテゾリズマブ+BV                            | アテゾリズマブ(1200mg/body)d1+ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                                                                                                                                                                        |
| 肝臓がん         | エドルピシン肝動注                             | エドルピシン(50mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                             |
| 肝臓がん         | デュルバルマブ(維持療法)                         | デュルバルマブ(1500mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                          |
| 肝臓がん         | ニボルマブ(2週間間隔)(維持療法)                    | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                                                                                                                                             |
| 肝臓がん         | ニボルマブ(4週間間隔)(維持療法)                    | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                                             |
| 肝臓がん         | ニボルマブ+イビリムマブ                          | ニボルマブ(80mg/body)d1+イビリムマブ(3mg/kg)d1 q3w                                                                                                                                                                                                             |
| 肝臓がん         | デュルバルマブ+トレメリムマブ                       | トレメリムマブ(300mg/body)d1+デュルバルマブ(1500mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                                                    |
| 急性白血病        | AZA                                   | アザシチジン(75mg/m <sup>2</sup> )d1-7 q4w                                                                                                                                                                                                                |
| 急性白血病        | AZA+Ven(1コース目)                        | アザシチジン(75mg/m <sup>2</sup> )d1-7+ベネトクラクス(10-400mg/body)d1-28 q4w                                                                                                                                                                                    |
| 急性白血病        | AZA+Ven(2コース目以降)                      | アザシチジン(75mg/m <sup>2</sup> )d1-7+ベネトクラクス(50-400mg/body)d1-28 q4w                                                                                                                                                                                    |
| 急性白血病        | GO 6mg day1, 3mg d8 分投投与              | ゲムツズマブオゾガマイシン(6mg/m <sup>2</sup> )d1+ゲムツズマブオゾガマイシン(3mg/m <sup>2</sup> )d8 q1w                                                                                                                                                                       |
| 急性白血病        | GO day1, 4.7, 3分投投与                   | ゲムツズマブオゾガマイシン(3mg/m <sup>2</sup> )d1, 4, 7 q1w                                                                                                                                                                                                      |
| 急性白血病        | GO地道め療法 2mg day1単回投与                  | ゲムツズマブオゾガマイシン(2mg/m <sup>2</sup> )d1 q1w                                                                                                                                                                                                            |
| 急性白血病        | JALSG-ALL202-U(維持療法(1)(3))            | メトトレキサート(150mg/m <sup>2</sup> )d1, 15, 29+メトトレキサート(12mg/body)d29+シタラビン(30mg/body)d29+ヒドロコルチゾン(25mg/body)d1+メルカプトプリン(内服50mg/m <sup>2</sup> )d1-28 q6w                                                                                                |
| 急性白血病        | JALSG-ALL202-U(維持療法(2))               | ビンクリスチン(1.5mg/kg)d1, 15+シクロホスファミド(600mg/m <sup>2</sup> )d8+L-アスバラギナーゼ(10000K.U./m <sup>2</sup> )d2, 9, 16+ブレドニゾロン(内服40mg/m <sup>2</sup> )d1-17 q4w                                                                                                  |
| 急性白血病        | JALSG-ALL202-U(維持療法(4))               | ビンクリスチン(1.5mg/kg)d1, 15+ヒラルピシン(25mg/m <sup>2</sup> )d8+L-アスバラギナーゼ(10000K.U./m <sup>2</sup> )d2, 9, 16+ブレドニゾロン(内服40mg/m <sup>2</sup> )d1-17 q4w                                                                                                      |

| がん種          | レジメン名                                             | レジメン内容(一般名)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 急性白血病        | JALSG-ALL202-U(寛解導入療法)                            | ビンクリスチン(1.5mg/kg)d8,15,22,29+ビラルビシン(25mg/m <sup>2</sup> )d8,9+シクロホスファミド(1200mg/m <sup>2</sup> )d10+L-アスパラギナーゼ(6000K.U./m <sup>2</sup> )d16,18,20,23,25,27,30,32+デキサメタゾン(8.25mg/m <sup>2</sup> )d8-14+ブレドニゾン(60mg/m <sup>2</sup> )d1-31+メトトレキサート(12mg/body)d1,8,22+シタラビン(30mg/body)d8,22+ヒドロコルチゾン(25mg/body)d8,22,29                                                                                                                                                     |
| 急性白血病        | JALSG-ALL202-U(再寛解導入療法)                           | ビンクリスチン(1.5mg/kg)d1,8,15+ビラルビシン(25mg/m <sup>2</sup> )d1,8+シクロホスファミド(1200mg/m <sup>2</sup> )d1,8+L-アスパラギナーゼ(6000K.U./m <sup>2</sup> )d2,4,6,9,11,13+メトトレキサート(12mg/body)d1+シタラビン(30mg/body)d1+ヒドロコルチゾン(25mg/body)d1+ブレドニゾン(内服40mg/m <sup>2</sup> )d1-17,24                                                                                                                                                                                                                |
| 急性白血病        | JALSG-ALL202-U(サングチュアリ療法)                         | メトトレキサート(3000mg/m <sup>2</sup> )d1,8+メトトレキサート(12mg/body)d2,9+シタラビン(30mg/body)d2,9+ヒドロコルチゾン(25mg/body)d2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 急性白血病        | JALSG-ALL202-U(地固め療法)                             | ビンクリスチン(25mg/m <sup>2</sup> )d1,2+シタラビン(75mg/m <sup>2</sup> )d1,6,8-13+シクロホスファミド(750mg/m <sup>2</sup> )d1,8+メトトレキサート(12mg/body)d1,8+シタラビン(30mg/body)d1,8+ヒドロコルチゾン(25mg/body)d1,8+メルカプトプリン(内服50mg/m <sup>2</sup> )d1-14                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 急性白血病        | POMP                                              | ビンクリスチン(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1+ブレドニゾン(内服60mg/m <sup>2</sup> )d1-5+メトトレキサート(内服20mg/m <sup>2</sup> )d1,8,15,22+メルカプトプリン(内服60mg/m <sup>2</sup> )d1-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 胸腺腫          | ADOC                                              | ドキソルビシン(40mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(50mg/m <sup>2</sup> )d1+ビンクリスチン(0.6mg/m <sup>2</sup> ・MAX1mg/body)d2+シクロホスファミド(700mg/m <sup>2</sup> )d4+ブレドニゾン(100mg/body)d1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 胸腺腫          | CAMP                                              | シスプラチン(20mg/m <sup>2</sup> )d1-4+ドキソルビシン(40mg/m <sup>2</sup> )d1+mブレドニゾン(1000mg/body)d1-4+メチルブレドニゾン(500mg/body)d5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 血管肉腫         | DXR                                               | ドキソルビシン(0.4→0.6mg/kg)d1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 血管肉腫         | weeklyPAC                                         | パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> )d1,8,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 原発不明がん       | ニボルマブ(2週間間隔)                                      | ニボルマブ(240mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 原発不明がん       | ニボルマブ(4週間間隔)                                      | ニボルマブ(480mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 骨髄異形成症候      | AZA                                               | アザシチジン(75mg/m <sup>2</sup> )d1-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 紅門がん         | 5-FU+CDDP+RT(インフューザーポンプ使用)                        | フルオロウラシル(4000mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 紅門がん         | 5-FU+CDDP+RT(インフューザーポンプ不使用)                       | フルオロウラシル(1000mg/m <sup>2</sup> )d1-4+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 紅門がん         | 5-FU+MMC+同時放射線療法                                  | フルオロウラシル(1000mg/m <sup>2</sup> )d1-4,29-32,マイトマイシンC(10mg/m <sup>2</sup> )d1,29,1コースの期間指定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 小児リンパ種       | B-NHL-14 COP(B)                                   | ビンクリスチン(1.0mg/m <sup>2</sup> ・MAX2mg/body)d1+シクロホスファミド(300mg/m <sup>2</sup> )d1+ブレドニゾン(60mg/m <sup>2</sup> )d1-5+メトトレキサート(8-15mg/body)d1+ヒドロコルチゾン(8-15mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 小児リンパ種       | B-NHL-14 COP(C1,C3)                               | ビンクリスチン(1.0mg/m <sup>2</sup> ・MAX2mg/body)d1+シクロホスファミド(300mg/m <sup>2</sup> )d1+ブレドニゾン(60mg/m <sup>2</sup> )d1-5+メトトレキサート(8-15mg/body)d1,3,5+シタラビン(15-30mg/body)d1,3,5+ヒドロコルチゾン(8-15mg/body)d1,3,5                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 神経芽腫         | ジメツキシマブ(CSF) 1,3,5コース目用                           | フィルグラスチム(5μg/kg)d1-14+ジメツキシマブ(17.5mg/m <sup>2</sup> )d4-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 神経芽腫         | ジメツキシマブ(IL-2) 2,4,6コース目用                          | デキサメタゾン(75mg単位/m <sup>2</sup> )d1-4+セロイキン(100mg単位/m <sup>2</sup> )d8-11+ジメツキシマブ(17.5mg/m <sup>2</sup> )d8-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 子宮体がん        | AP                                                | ドキソルビシン(60mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(50mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 子宮体がん        | DC+デュルバルマブ                                        | ドセタキセル(70mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1+デュルバルマブ(1120mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 子宮体がん        | TC                                                | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 子宮体がん        | TC+デュルバルマブ                                        | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1+デュルバルマブ(1120mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 子宮体がん        | TC+ヘム7ロシマブ                                        | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+ヘム7ロシマブ(200mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 子宮体がん        | weeklyPAC                                         | パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> )d1,8,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 子宮体がん        | デュルバルマブ(維持療法)                                     | デュルバルマブ(1500mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 子宮体がん        | デュルバルマブ+オラパリブ(維持療法)                               | デュルバルマブ(1500mg/body)d1+オラパリブ(600mg/body)d1-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 子宮体がん        | ベムプロリズマブ(3週間間隔)(維持療法)                             | ヘム7ロシマブ(200mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 子宮体がん        | ベムプロリズマブ(3週間間隔)+レンパチニブ                            | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+レンパチニブ(20mg/body)d1-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 子宮体がん        | ベムプロリズマブ(6週間間隔)(維持療法)                             | ヘム7ロシマブ(400mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 子宮体がん        | ベムプロリズマブ(6週間間隔)+レンパチニブ                            | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1+レンパチニブ(20mg/body)d1-42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 子宮肉腫         | IAP                                               | イホスファミド(1000mg/body)d1-5+ドキソルビシン(40mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 子宮頸がん        | BV(維持療法)                                          | ベパシズマブ(15mg/kg)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 子宮頸がん        | BV+ベムプロリズマブ(維持療法)                                 | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+ベパシズマブ(15mg/kg)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 子宮頸がん        | CCRT(CDDP+radiation) 入院用                          | シスプラチン(40mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 子宮頸がん        | CCRT(CDDP+radiation) 外来用                          | シスプラチン(40mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 子宮頸がん        | CCRT(CDDP+radiation)+ヘム7ロシマブ 外来用                  | シスプラチン(40mg/m <sup>2</sup> )d1,8,15+ヘム7ロシマブ(200mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 子宮頸がん        | CCRT(CDDP+radiation)+ヘム7ロシマブ 入院用                  | シスプラチン(40mg/m <sup>2</sup> )d1,8,15+ヘム7ロシマブ(200mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 子宮頸がん        | CPT-11(A法)                                        | イリリネカン(100mg/m <sup>2</sup> )d1,8,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 子宮頸がん        | TC                                                | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 子宮頸がん        | TC+BV                                             | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1+ベパシズマブ(15mg/kg)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 子宮頸がん        | TC+BV+ベムプロリズマブ                                    | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+ベパシズマブ(15mg/kg)d1+ベムプロリズマブ(200mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 子宮頸がん        | TC+ベムプロリズマブ                                       | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+ベムプロリズマブ(200mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 子宮頸がん        | TP                                                | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(50mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 子宮頸がん        | TP+BV                                             | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(50mg/m <sup>2</sup> )d1+ベパシズマブ(15mg/kg)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 子宮頸がん        | TP+BV+ベムプロリズマブ                                    | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(50mg/m <sup>2</sup> )d1+ベパシズマブ(15mg/kg)d1+ベムプロリズマブ(200mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 子宮頸がん        | TP+ベムプロリズマブ                                       | パクリタキセル(175mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(50mg/m <sup>2</sup> )d1+ベムプロリズマブ(200mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 子宮頸がん        | weeklyTC                                          | パクリタキセル(60mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC2・MAX300mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 子宮頸がん        | セシリマブ                                             | セシリマブ(350mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 子宮頸がん        | チンツマブ ベドチン                                        | チンツマブ ベドチン(2mg/kg)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 子宮頸がん        | ベムプロリズマブ(3週間間隔)(維持療法)                             | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 子宮頸がん        | ベムプロリズマブ(6週間間隔)(維持療法)                             | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-B12 Ia2 day8-35                               | ビンクリスチン(1.5mg/m <sup>2</sup> ・MAX2mg/body)d1,8,15,22+ダウノルビシン(30mg/m <sup>2</sup> )d1,8+L-アスパラギナーゼ(5000K.U./m <sup>2</sup> )d5,8,11,14,17,20,23,26+ブレドニゾン(60mg/m <sup>2</sup> )d1-21+ブレドニゾン(30→15→7.5mg/m <sup>2</sup> )d22-30+メトトレキサート(8-12mg/body)d5,26,(11,20)+シタラビン(20-30mg/body)d5,26,(11,20)+ブレドニゾン(6-10mg/body)d5,26,(11,20)                                                                                                                                      |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-B12 Ib day36-77                               | シクロホスファミド(1000mg/m <sup>2</sup> )d1,29+シタラビン(75mg/m <sup>2</sup> )d3-6,10-13,17-20,24-27+メルカプトプリン(60mg/m <sup>2</sup> )d1-28+メトトレキサート(8-12mg/body)d10,24+シタラビン(20-30mg/body)d10,24+ブレドニゾン(6-10mg/body)d10,24                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-B12 III                                       | ビンクリスチン(1.5mg/m <sup>2</sup> )d1,8+ビラルビシン(25mg/m <sup>2</sup> )d1,8+シクロホスファミド(500mg/m <sup>2</sup> )d15+シタラビン(75mg/m <sup>2</sup> )d17-20,24-27+10歳以上デキサメタゾン(10mg/m <sup>2</sup> )d1-7,15-21+10歳未満デキサメタゾン(10mg/m <sup>2</sup> )d1-14+10歳未満デキサメタゾン(5→2.5→1.25mg/m <sup>2</sup> )d15-23+メルカプトプリン(60mg/m <sup>2</sup> )d15-28+L-アスパラギナーゼ(10000K.U./m <sup>2</sup> )d1,4,8,11+メトトレキサート(8-12mg/body)d17,24(d11)+シタラビン(20-30mg/body)d17,24(d11)+ブレドニゾン(6-10mg/body)d17,24(d1) |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-B12 Ip day1-7                                 | メトトレキサート(8-12mg/body)d1+ブレドニゾン(15→30→60mg/m <sup>2</sup> )d1-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-B12 M2                                        | メトトレキサート(2000mg/m <sup>2</sup> )d8,22,36,50+メルカプトプリン(25mg/m <sup>2</sup> )d1-56+メトトレキサート(8-12mg/body)d8,22,36,50+シタラビン(20-30mg/body)d8,22,36,50+ブレドニゾン(6-10mg/body)d8,22,36,50                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-B19 (LR arm-B12SR,SR,IR維持療法)                  | メトトレキサート(20mg/m <sup>2</sup> )d1,8,15,22,29,36,43,50+6-MP(50mg/m <sup>2</sup> )d1-56+メトトレキサート(8-12mg/body)d1+シタラビン(20-30mg/body)d1+ブレドニゾン(6-10mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-BFM95 Ia                                      | ビンクリスチン(1.5mg/m <sup>2</sup> ・MAX2mg/body)d8,15,22,29+ドキソルビシン(30mg/m <sup>2</sup> )d8,15,22+10歳以上(10mg/m <sup>2</sup> )d1-7,15-21+10歳以上デキサメタゾン(5→2.5→1.25mg/m <sup>2</sup> )d22-30+10歳未満デキサメタゾン(10mg/m <sup>2</sup> )d1-21+10歳未満デキサメタゾン(5→2.5→1.25mg/m <sup>2</sup> )d22-30+L-アスパラギナーゼ(10000K.U./m <sup>2</sup> )d8,11,15,18+メトトレキサート(8-12mg/body)d1,18+キロサイド(20-30mg/body)d1,18+ブレドニゾン(6-10mg/body)d1,18                                                               |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-BFM95 Ib                                      | シクロホスファミド(1000mg/m <sup>2</sup> )d1+シタラビン(75mg/m <sup>2</sup> )d3,4,5,6,10,11,12,13+メルカプトプリン(60mg/m <sup>2</sup> )d1-14+メトトレキサート(8-12mg/body)d3,10+シタラビン(20-30mg/body)d3,10+ブレドニゾン(6-10mg/body)d3,10                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-Ph18 DP day1-35                               | ダサチニブ(80mg/m <sup>2</sup> ・MAX140mg/body)d1-35+ブレドニゾン(60mg/m <sup>2</sup> )d1-21+ブレドニゾン(30→15→7.5mg/m <sup>2</sup> )d22-30+メトトレキサート(8-12mg/body)d5,26,(11,20)+シタラビン(20-30mg/body)d5,26,(11,20)+ブレドニゾン(6-10mg/body)d5,26,(11,20)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 小児急性リンパ性白血病  | ALL-Ph18 IA day36-56                              | ビンクリスチン(1.5mg/m <sup>2</sup> ・MAX2mg/body)d1,8,15+ダウノルビシン(30mg/m <sup>2</sup> )d1,(8)+ブレドニゾン(40mg/m <sup>2</sup> )d1-14+ダサチニブ(60mg/m <sup>2</sup> ・MAX100mg/body)d1-21+メトトレキサート(8-12mg/body)d8+シタラビン(20-30mg/body)d8+ブレドニゾン(6-10mg/body)d8                                                                                                                                                                                                                              |
| 小児急性前骨髄球性白血病 | AML-P13 AA-I                                      | 三酸化二元素(0.15mg/kg)d2-9,13,16-20,23-27,30-34+トレチノイン(45mg/m <sup>2</sup> ・MAX80mg/body)d2-15+メトトレキサート(3-12mg/body)d1+シタラビン(6-30mg/body)d1+ヒドロコルチゾン(10-25mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 小児急性前骨髄球性白血病 | AML-P13 ACD                                       | ダウノルビシン(45mg/m <sup>2</sup> )d8-10+キロサイド(200mg/m <sup>2</sup> )d8-14+トレチノイン(45mg/m <sup>2</sup> ・MAX80mg/body)d1+35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 小児急性前骨髄球性白血病 | AML-P13 HCMA                                      | シタラビン(3000mg/m <sup>2</sup> ×2)d1-3+ミキサントロン(10mg/m <sup>2</sup> )d1+トレチノイン(45mg/m <sup>2</sup> ・MAX80mg/body)d4-10+メトトレキサート(3-12mg/body)d1+シタラビン(6-30mg/body)d1+ヒドロコルチゾン(10-25mg/body)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 小児脳腫瘍        | BEP                                               | プレオマイシン(15mg/m <sup>2</sup> )d1+エトポシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-5+シスプラチン(20mg/m <sup>2</sup> )d1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 食道がん         | 5-FU+ベムプロリズマブ(インフューザーポンプ使用)(FP+ベムプロリズマブの2コース目以降)  | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+フルオロウラシル(4000mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 食道がん         | 5-FU+ベムプロリズマブ(インフューザーポンプ不使用)(FP+ベムプロリズマブの2コース目以降) | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+フルオロウラシル(800mg/m <sup>2</sup> )d1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 食道がん         | CDGP+5-FU(9905)(インフューザーポンプ使用)                     | フルオロウラシル(4000mg/m <sup>2</sup> )d1+ネダプラチン(90mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 食道がん         | CDGP+5-FU(9905)(インフューザーポンプ不使用)                    | フルオロウラシル(800mg/m <sup>2</sup> )d1-5+ネダプラチン(90mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 食道がん         | DCF(1109)(インフューザーポンプ使用)                           | ドセタキセル(70mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(70mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウラシル(3750mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 食道がん         | DCF(1109)(インフューザーポンプ不使用)                          | ドセタキセル(70mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(70mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウラシル(750mg/m <sup>2</sup> )d1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 食道がん         | DOC                                               | ドセタキセル(70mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 食道がん         | FOLFOX+radiation                                  | オキサリプラチン(85mg/m <sup>2</sup> )d1+レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウラシル(bolus400mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウラシル(1600mg/m <sup>2</sup> 46hrs)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 食道がん         | FP(9907)(インフューザーポンプ使用)                            | フルオロウラシル(4000mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 食道がん         | FP(9907)(インフューザーポンプ不使用)                           | フルオロウラシル(800mg/m <sup>2</sup> )d1-5+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 食道がん         | FP(CDDP分割)(インフューザーポンプ使用)                          | フルオロウラシル(4000mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(20mg/m <sup>2</sup> )d1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 食道がん         | FP(CDDP分割)(インフューザーポンプ不使用)                         | フルオロウラシル(800mg/m <sup>2</sup> )d1-5+シスプラチン(20mg/m <sup>2</sup> )d1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 食道がん         | FP+radiation(9708)(インフューザーポンプ使用)                  | フルオロウラシル(2800mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(70mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 食道がん         | FP+radiation(9708)(インフューザーポンプ不使用)                 | フルオロウラシル(700mg/m <sup>2</sup> )d1-4+シスプラチン(70mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 食道がん         | FP+radiation(9906)(インフューザーポンプ使用)                  | フルオロウラシル(2000mg/m <sup>2</sup> )d1,8+シスプラチン(40mg/m <sup>2</sup> )d1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 食道がん         | FP+radiation(9906)(インフューザーポンプ不使用)                 | フルオロウラシル(400mg/m <sup>2</sup> )d1-5,8-12+シスプラチン(40mg/m <sup>2</sup> )d1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 食道がん         | FP+radiation(RTOG94-05)(インフューザーポンプ使用)             | フルオロウラシル(4000mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 食道がん         | FP+radiation(RTOG94-05)(インフューザーポンプ不使用)            | フルオロウラシル(1000mg/m <sup>2</sup> )d1-4+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 食道がん         | FP+ベムプロリズマブ(インフューザーポンプ使用)                         | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+フルオロウラシル(4000mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 食道がん         | FP+ベムプロリズマブ(インフューザーポンプ不使用)                        | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+フルオロウラシル(800mg/m <sup>2</sup> )d1-5+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 食道がん         | lowdoseFP+radiation(0303B)(インフューザーポンプ使用)          | フルオロウラシル(1000mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(4mg/m <sup>2</sup> )d1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 食道がん         | lowdoseFP+radiation(0303B)(インフューザーポンプ不使用)         | フルオロウラシル(200mg/m <sup>2</sup> )d1-5+シスプラチン(4mg/m <sup>2</sup> )d1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 食道がん         | mFOLFOX6                                          | オキサリプラチン(85mg/m <sup>2</sup> )d1+レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウラシル(bolus400mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウラシル(2400mg/m <sup>2</sup> 46hrs)d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 食道がん         | PAC(B法)                                           | パクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> )d1,8,15,22,29,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| がん種          | レジメン名                  | レジメン内容(一般名)                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 食道がん         | ニボルマブ(2週間間隔)           | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                                                                                             |
| 食道がん         | ニボルマブ(2週間間隔)+イビリムマブ    | ニボルマブ(240mg/body)d1, 15, 29+イビリムマブ(1mg/kg)d1 q6w                                                                                                                                                    |
| 食道がん         | ニボルマブ(3週間間隔)+イビリムマブ    | ニボルマブ(360mg/body)d1, 22+イビリムマブ(1mg/kg)d1 q6w                                                                                                                                                        |
| 食道がん         | ニボルマブ(4週間間隔)           | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                             |
| 神経内分泌がん      | CPT-11+GDDP            | イリリノテカン(65mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(30mg/m <sup>2</sup> )d1, 8 q3w                                                                                                                            |
| 腎芽腫          | EE-4A week0-2          | アクチノマイシンD(0.045mg/kg)d1+ビンクリスチン(0.05mg/kg・MAX2mg/body)d3, 10 q16days                                                                                                                                |
| 腎芽腫          | EE-4A week12-18        | アクチノマイシンD(0.045mg/kg)d1+ビンクリスチン(0.067mg/kg・MAX2mg/body)d1 q3w                                                                                                                                       |
| 腎芽腫          | EE-4A week3-8          | アクチノマイシンD(0.045mg/kg)d1+ビンクリスチン(0.05mg/kg・MAX2mg/body)d1, 8, 15 q3w                                                                                                                                 |
| 腎芽腫          | EE-4A week9-11         | アクチノマイシンD(0.045mg/kg)d1+ビンクリスチン(0.05mg/kg・MAX2mg/body)d1, 8 q3w                                                                                                                                     |
| 腎細胞がん        | アベルマブ+アキシチニブ           | アベルマブ(10mg/kg)d1+アキシチニブ(10mg/body)d1-14 q2w                                                                                                                                                         |
| 腎細胞がん        | テムシロリムス                | テムシロリムス(25mg/body)d1 q1w                                                                                                                                                                            |
| 腎細胞がん        | ニボルマブ(2週間間隔)           | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                                                                                             |
| 腎細胞がん        | ニボルマブ(2週間間隔)+カボザンチニブ   | ニボルマブ(240mg/body)d1+カボザンチニブ(40mg/body)d1-14 q2w                                                                                                                                                     |
| 腎細胞がん        | ニボルマブ(4週間間隔)           | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                                                                                             |
| 腎細胞がん        | ニボルマブ(4週間間隔)+カボザンチニブ   | ニボルマブ(480mg/body)d1+カボザンチニブ(40mg/body)d1-28 q4w                                                                                                                                                     |
| 腎細胞がん        | ニボルマブ+イビリムマブ           | ニボルマブ(240mg/body)d1+イビリムマブ(1mg/kg)d1 q3w                                                                                                                                                            |
| 腎細胞がん        | ベムプロリスマブ(3週間間隔)+アキシチニブ | ベムプロリスマブ(200mg/body)d1+アキシチニブ(10mg/body)d1-21 q3w                                                                                                                                                   |
| 腎細胞がん        | ベムプロリスマブ(3週間間隔)+レンパチニブ | ベムプロリスマブ(200mg/body)d1+レンパチニブ(20mg/body)d1-21 q3w                                                                                                                                                   |
| 腎細胞がん        | ベムプロリスマブ(6週間間隔)+アキシチニブ | ベムプロリスマブ(400mg/body)d1+アキシチニブ(10mg/body)d1-42 q6w                                                                                                                                                   |
| 腎細胞がん        | ベムプロリスマブ(6週間間隔)+レンパチニブ | ベムプロリスマブ(400mg/body)d1+レンパチニブ(20mg/body)d1-42 q6w                                                                                                                                                   |
| 腎細胞がん        | ベムプロリスマブ(3週間間隔)        | ベムプロリスマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                                                                                          |
| 腎細胞がん        | ベムプロリスマブ(6週間間隔)        | ベムプロリスマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                                                                                          |
| 肺・消化管神経内分泌腫瘍 | dailySTZ               | ザノサー(500mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q6w                                                                                                                                                                 |
| 肺・消化管神経内分泌腫瘍 | dailySTZ+5-FU          | フルオロウシル(400mg/m <sup>2</sup> )d1-5+ザノサー(500mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q6w                                                                                                                              |
| 肺・消化管神経内分泌腫瘍 | weeklySTZ              | ザノサー(1000mg/m <sup>2</sup> or 1250mg/m <sup>2</sup> or 1500mg/m <sup>2</sup> )d1 q1w                                                                                                                |
| 膀胱がん         | GEM                    | ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                                                                                         |
| 膀胱がん         | GEM+S1                 | ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1-15朝 q3w                                                                                                                          |
| 膀胱がん         | mFOLFIRINOX            | オキサリプラチン(85mg/m <sup>2</sup> )d1+イリノテカン(150mg/m <sup>2</sup> )d1+レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウシル(2400mg/m <sup>2</sup> 46hrs)d1 q2w                                                        |
| 膀胱がん         | nab-PAC+GEM            | ナブパブリタキセル(125mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                                               |
| 膀胱がん         | nal-IRI+5-FU+LV        | イリノテカン塩酸塩水和物/ボソノム(70mg/m <sup>2</sup> )d1+レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウシル(2400mg/m <sup>2</sup> 46hrs)d1 q2w                                                                               |
| 膀胱がん(医師限定)   | FOLFIRINOX             | オキサリプラチン(85mg/m <sup>2</sup> )d1+イリノテカン(180mg/m <sup>2</sup> )d1+レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウシル(bolus400mg/m <sup>2</sup> )d1+フルオロウシル(2400mg/m <sup>2</sup> 46hrs)d1 q2w                  |
| 精巣腫瘍         | PEB                    | シスプラチン(20mg/m <sup>2</sup> )d1+エトポシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-5+プレオマイシン(30mg/body)d1, 8, 15 q3w                                                                                                     |
| 精巣腫瘍         | TIN                    | パクリタキセル(210mg/m <sup>2</sup> )d1+イホスファミド(1200mg/m <sup>2</sup> )d2-6+ネダプラチン(100mg/m <sup>2</sup> )d2 q3w                                                                                            |
| 精巣腫瘍         | TIP                    | パクリタキセル(210mg/m <sup>2</sup> )d1+イホスファミド(1200mg/m <sup>2</sup> )d2-6+シスプラチン(20mg/m <sup>2</sup> )d2-6 q3w                                                                                           |
| 精巣腫瘍         | VIP                    | エトポシド(75mg/m <sup>2</sup> )d1-5+イホスファミド(1200mg/m <sup>2</sup> )d1-5+シスプラチン(20mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q3w                                                                                            |
| 前立腺がん        | CAB+PSL                | カンジタキセル(25mg/m <sup>2</sup> )d1+ブレニゾロン(10mg/body)d1-21 q3w                                                                                                                                          |
| 前立腺がん        | DOC+DEX                | ドセタキセル(75mg/m <sup>2</sup> )d1+デキサメタゾン(1mg/body)d1-21 q3w                                                                                                                                           |
| 前立腺がん        | DOC+PSL                | ドセタキセル(75mg/m <sup>2</sup> )d1+ブレニゾロン(10mg/body)d1-21 q3w                                                                                                                                           |
| 前立腺がん(小細胞がん) | CBDCA+VP-16            | エトポシド(80mg/m <sup>2</sup> )d1-3+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3~4w                                                                                                                                 |
| 多発性骨髄腫       | DaraCyBoRd(1, 2コース目)   | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 8, 15, 22+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15, 22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+シクロホスファミド(内服300mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15, 22 q4w  |
| 多発性骨髄腫       | DaraCyBoRd(3~6コース目)    | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 15+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15, 22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+シクロホスファミド(内服300mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15, 22 q4w         |
| 多発性骨髄腫       | DaraCyBoRd(7コース目以降)    | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15, 22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+シクロホスファミド(内服300mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15, 22 q4w             |
| 多発性骨髄腫       | Isa±DEX(1コース目)         | イサツキシマブ(20mg/kg)d1, 8, 15, 22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                                                                                                                |
| 多発性骨髄腫       | Isa±DEX(2コース目以降)       | イサツキシマブ(20mg/kg)d1, 15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                                                                                                                       |
| 多発性骨髄腫       | IsaKD(1コース目)           | イサツキシマブ(10mg/kg)d1, 8, 15, 22+カルフィルゾミブ(20mg/m <sup>2</sup> )d1, 2+カルフィルゾミブ(56mg/m <sup>2</sup> )d8, 9, 15, 16+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 q4w                |
| 多発性骨髄腫       | IsaKD(2コース目以降)         | イサツキシマブ(10mg/kg)d1, 15+カルフィルゾミブ(56mg/m <sup>2</sup> )d1, 2, 8, 9, 15, 16+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 q4w                                                     |
| 多発性骨髄腫       | DKD(1コース目)             | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 8, 15, 22+カルフィルゾミブ(20mg/m <sup>2</sup> )d1, 2+カルフィルゾミブ(56mg/m <sup>2</sup> )d8, 9, 15, 16+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 q4w |
| 多発性骨髄腫       | DKD(2コース目)             | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 8, 15, 22+カルフィルゾミブ(56mg/m <sup>2</sup> )d1, 2, 8, 9, 15, 16+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 q4w                               |
| 多発性骨髄腫       | DKD(3~6コース目)           | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 8, 15, 22+カルフィルゾミブ(56mg/m <sup>2</sup> )d1, 2, 8, 9, 15, 16+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 q4w                               |
| 多発性骨髄腫       | DKD(7コース目以降)           | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1+カルフィルゾミブ(56mg/m <sup>2</sup> )d1, 2, 8, 9, 15, 16+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 q4w                                          |
| 多発性骨髄腫       | DPD(1, 2コース目)          | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 8, 15, 22+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                                                                     |
| 多発性骨髄腫       | DPD(3~6コース目)           | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 15+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                                                                            |
| 多発性骨髄腫       | DPD(7コース目以降)           | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                                                                                |
| 多発性骨髄腫       | DRD(1, 2コース目 ダラツムマブ静注) | ダラツムマブ(16mg/kg)d1, 8, 15, 22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                                        |
| 多発性骨髄腫       | DRD(1, 2コース目)          | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 8, 15, 22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                    |
| 多発性骨髄腫       | DRD(3~6コース目 ダラツムマブ静注)  | ダラツムマブ(16mg/kg)d1, 15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                                               |
| 多発性骨髄腫       | DRD(3~6コース目)           | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                           |
| 多発性骨髄腫       | DRD(7コース目以降 ダラツムマブ静注)  | ダラツムマブ(16mg/kg)d1+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                                                   |
| 多発性骨髄腫       | DRD(7コース目以降)           | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                               |
| 多発性骨髄腫       | DVD(1~3コース目 ダラツムマブ静注)  | ダラツムマブ(16mg/kg)d1, 8, 15+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1, 4, 8, 11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 q3w                                                             |
| 多発性骨髄腫       | DVD(1~3コース目)           | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 8, 15+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1, 4, 8, 11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 q3w                                         |
| 多発性骨髄腫       | DVD(4コース目以降 ダラツムマブ静注)  | ダラツムマブ(16mg/kg)d1+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1, 4, 8, 11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 q4w                                                                    |
| 多発性骨髄腫       | DVD(4コース目以降)           | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1, 4, 8, 11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 q3w                                                |
| 多発性骨髄腫       | DVMP(1コース目)            | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 8, 15, 22, 29, 36+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32+メルファラン(内服9mg/m <sup>2</sup> )d1-4+ブレニゾロン(内服60mg/m <sup>2</sup> )d1-4 q6w         |
| 多発性骨髄腫       | DVMP(2コース目以降)          | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 22+ボルテゾミブ(1.3mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 22, 29+メルファラン(内服9mg/m <sup>2</sup> )d1-4+ブレニゾロン(内服60mg/m <sup>2</sup> )d1-4 q6w                                       |
| 多発性骨髄腫       | DwKD(1コース目)            | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 8, 15, 22+カルフィルゾミブ(20mg/m <sup>2</sup> )d1+カルフィルゾミブ(70mg/m <sup>2</sup> )d8, 15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                       |
| 多発性骨髄腫       | DwKD(2コース目)            | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 8, 15, 22+カルフィルゾミブ(70mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                                                     |
| 多発性骨髄腫       | DwKD(3~6コース目)          | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1, 15+カルフィルゾミブ(70mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                                                            |
| 多発性骨髄腫       | DwKD(7コース目以降)          | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1+カルフィルゾミブ(70mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                                                                |
| 多発性骨髄腫       | Elranatamab(1コース目)     | エルラナタマブ(12mg/body)d1+エルラナタマブ(32mg/body)d4+エルラナタマブ(76mg/body)d8, 15, 22 q4w                                                                                                                          |
| 多発性骨髄腫       | Elranatamab(2~6コース目)   | エルラナタマブ(76mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                                                                                                                                                                 |
| 多発性骨髄腫       | Elranatamab(7コース目以降)   | エルラナタマブ(76mg/body)d1, 15 q4w                                                                                                                                                                        |
| 多発性骨髄腫       | EPD(1, 2コース目)          | エロツスマブ(10mg/kg)d1, 8, 15, 22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21 q4w                                                                                         |
| 多発性骨髄腫       | EPD(3コース目以降)           | エロツスマブ(20mg/kg)d1+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21 q4w                                                                                                    |
| 多発性骨髄腫       | ERD(1, 2コース目)          | エロツスマブ(10mg/kg)d1, 8, 15, 22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                                        |
| 多発性骨髄腫       | ERD(3コース目以降)           | エロツスマブ(10mg/kg)d1, 15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                                               |
| 多発性骨髄腫       | IRd                    | レナリドミド(内服25mg/body)d1-21+イキサゾミブ(内服4mg/body)d1, 8, 15+デキサメタゾン(内服40mg/body)d1, 8, 15, 22 q4w                                                                                                          |
| 多発性骨髄腫       | IsaPD(1コース目)           | イサツキシマブ(10mg/kg)d1, 8, 15, 22+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21 q4w                                                                                        |
| 多発性骨髄腫       | IsaPD(2コース目以降)         | イサツキシマブ(10mg/kg)d1, 15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-21 q4w                                                                                               |
| 多発性骨髄腫       | Kd                     | カルフィルゾミブ(初回20mg/m <sup>2</sup> , 2回目以降70mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22(d22は10コース目以降投与なし) q4w                                                       |
| 多発性骨髄腫       | KRD(13コース目以降)          | カルフィルゾミブ(27mg/m <sup>2</sup> )d1, 2, 15, 16+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                                                         |
| 多発性骨髄腫       | KRD(1コース目)             | カルフィルゾミブ(20mg/m <sup>2</sup> )d1, 2+カルフィルゾミブ(27mg/m <sup>2</sup> )d8, 9, 15, 16+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1, 8, 15, 22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                                     |

| がん種        | レジメン名                                | レジメン内容(一般名)                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 多発性骨髄腫     | KRD(2～12コース目)                        | カルフィルゾミブ(27mg/㎡)d1、2、8、9、15、16+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22+レナリドミド(内服25mg/body)d1-21 q4w                     |
| 多発性骨髄腫     | VCD                                  | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1、8、15、22+シクロホスファミド(内服300mg/㎡)d1、8、15、22+デキサメタゾン(内服40mg/body)d1、8、15、22 q4～5w                                   |
| 多発性骨髄腫     | VD(biweekly VD ボルテゾミブ皮下注)            | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1、15+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、15 q4～5w                                                         |
| 多発性骨髄腫     | VD(twice per week VD ボルテゾミブ皮下注)      | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1、4、8、11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、4、5、8、9、11、12 q3w                                          |
| 多発性骨髄腫     | VD(weekly VD ボルテゾミブ皮下注)              | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1、8、15、22+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、8、15、22 q4～5w                                               |
| 多発性骨髄腫     | VenBd療法                              | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1、8、15、22+ベネトクラクス(10-600mg/body)d1-35+デキサメタゾン(内服40mg/body)d1、8、15、22 q5w                                        |
| 多発性骨髄腫     | VenDd療法                              | ダラツムマブ・ボルヒアロニダーゼ アルファ(1800mg/body)d1、8、15、22+ベネトクラクス(10-600mg/body)d1-28+デキサメタゾン(点滴静注33mg/body or 内服40mg/body)d1、8、15、22 q4w    |
| 多発性骨髄腫     | VenKd療法                              | カルフィルゾミブ(初回20mg/㎡、2回目以降70mg/㎡)d1、8、15+ベネトクラクス(10-600mg/body)d1-28+デキサメタゾン(内服40mg/body)d1、8、15、22 q4w                            |
| 多発性骨髄腫     | VMP                                  | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1、8、15、22+メルファラン(内服6mg/㎡)d1-4+ブレニソロン(内服40mg/㎡)d1-4 q5w                                                          |
| 多発性骨髄腫     | VPD(1～8コース目)                         | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1、4、8、11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、4、5、8、9、11、12+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-14 q3w                  |
| 多発性骨髄腫     | VPD(9コース目以降)                         | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1、8+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、4、8、9+ボマリドミド(内服4mg/body)d1-14 q3w                               |
| 多発性骨髄腫     | VRD                                  | ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)d1、4、8、11+デキサメタゾン(点滴静注16.5mg/body or 内服20mg/body)d1、2、4、5、8、9、11、12+レナリドミド(内服25mg/body)d1-14 q3w                 |
| 大腸がん       | 5-FU+L+LV+BV                         | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                                       |
| 大腸がん       | 5-FU+L+LV+BV(末梢ルート)                  | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                                       |
| 大腸がん       | 5-FU肝動注                              | フルオロウシル(1000mg/㎡)d1 q1w                                                                                                         |
| 大腸がん       | CPT-11(A法)                           | イリノテカン(100mg/㎡)d1、8、15 q4w                                                                                                      |
| 大腸がん       | CPT-11(B法2回)                         | イリノテカン(150mg/㎡)d1、15 q5w                                                                                                        |
| 大腸がん       | CPT-11(B法3回)                         | イリノテカン(150mg/㎡)d1、15、29 q7w                                                                                                     |
| 大腸がん       | FOLFIRI                              | イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                                      |
| 大腸がん       | FOLFIRI(末梢ルート)                       | イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                                      |
| 大腸がん       | FOLFIRI+BV                           | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                     |
| 大腸がん       | FOLFIRI+BV(末梢ルート)                    | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                     |
| 大腸がん       | FOLFIRI+RAM                          | ラムシルマブ(8mg/kg)d1+イリノテカン(180mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                     |
| 大腸がん       | FOLFIRI+セツキシマブ(1週間間隔)                | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1、d8+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w  |
| 大腸がん       | FOLFIRI+セツキシマブ(1週間間隔)(末梢ルート)         | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1、d8+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w  |
| 大腸がん       | FOLFIRI+セツキシマブ(2週間間隔)                | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                    |
| 大腸がん       | FOLFIRI+セツキシマブ(2週間間隔)(末梢ルート)         | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                    |
| 大腸がん       | FOLFIRI+パニツムマブ                       | パニツムマブ(6mg/kg)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                     |
| 大腸がん       | FOLFIRI+パニツムマブ(末梢ルート)                | パニツムマブ(6mg/kg)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                     |
| 大腸がん       | HER+PER 1コース目用                       | トラスツズマブ(600mg/body)・ペルツズマブ(1200mg/body)d1 q3w                                                                                   |
| 大腸がん       | HER+PER 2コース目以降用                     | トラスツズマブ(600mg/body)・ペルツズマブ(600mg/body)d1 q3w                                                                                    |
| 大腸がん       | mFOLFOX6                             | オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                                     |
| 大腸がん       | mFOLFOX6(末梢ルート)                      | オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                                     |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+BV                          | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                    |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+BV(末梢ルート)                   | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                    |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+セツキシマブ(1週間間隔)               | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1、d8+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+セツキシマブ(1週間間隔)(末梢ルート)        | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1、d8+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+セツキシマブ(2週間間隔)               | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                   |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+セツキシマブ(2週間間隔)(末梢ルート)        | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                   |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+パニツムマブ                      | パニツムマブ(6mg/kg)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                    |
| 大腸がん       | mFOLFOX6+パニツムマブ(末梢ルート)               | パニツムマブ(6mg/kg)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(bolus400mg/㎡)d1+フルオロウシル(2400mg/㎡)46hrs)d1 q2w                    |
| 大腸がん       | SIR                                  | イリノテカン(150mg/㎡)d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1-14 q3w                                                                         |
| 大腸がん       | SIRB                                 | ベパシズマブ(7.5mg/kg)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                    |
| 大腸がん       | SOX+BV                               | ベパシズマブ(7.5mg/kg)d1+オキサリプラチン(130mg/㎡)d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                  |
| 大腸がん       | TAS-102+BV                           | ベパシズマブ(5mg/kg)d1、15+TAS-102(トリフルリジン・チベラシル)(内服)d1タ-6朝、q8タ-13朝 q4w                                                                |
| 大腸がん       | XELIRI                               | イリノテカン(200mg/㎡)d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                         |
| 大腸がん       | XELIRI+BV                            | ベパシズマブ(7.5mg/kg)d1+イリノテカン(200mg/㎡)d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                      |
| 大腸がん       | XELOX                                | オキサリプラチン(130mg/㎡)d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                       |
| 大腸がん       | XELOX+BV                             | ベパシズマブ(7.5mg/kg)d1+オキサリプラチン(130mg/㎡)d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                    |
| 大腸がん       | カベシタピン+BV                            | ベパシズマブ(7.5mg/kg)d1+カベシタピン(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                                        |
| 大腸がん       | セツキシマブ(1週間間隔)                        | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1 q1w                                                                                            |
| 大腸がん       | セツキシマブ(1週間間隔)+CPT-11(1週間間隔)          | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1、d8、15、22、29、36+イリノテカン(100mg/㎡)d1、8、15、22 q6w                                                   |
| 大腸がん       | セツキシマブ(2週間間隔)                        | セツキシマブ(500mg/㎡)d1 q2w                                                                                                           |
| 大腸がん       | セツキシマブ(2週間間隔)+CPT-11(2週間間隔)          | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1 q2w                                                                                         |
| 大腸がん       | パニツムマブ                               | パニツムマブ(6mg/kg)d1 q2w                                                                                                            |
| 大腸がん       | パニツムマブ+CPT-11                        | パニツムマブ(6mg/kg)d1+イリノテカン(150mg/㎡)d1 q2w                                                                                          |
| 大腸がん(医師限定) | 5-FU+L+LV(FOLFOXIRIの13コース目以降用)       | レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(3200mg/㎡)46hrs)d1 q2w                                                                                |
| 大腸がん(医師限定) | 5-FU+L+LV+BV(FOLFOXIRI+BVの13コース目以降用) | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(3200mg/㎡)46hrs)d1 q2w                                                               |
| 大腸がん(医師限定) | FOLFOXIRI                            | イリノテカン(165mg/㎡)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(3200mg/㎡)46hrs)d1 q2w                                           |
| 大腸がん(医師限定) | FOLFOXIRI+BV                         | ベパシズマブ(5mg/kg)d1+イリノテカン(165mg/㎡)d1+オキサリプラチン(85mg/㎡)d1+レボホリナート(200mg/㎡)d1+フルオロウシル(3200mg/㎡)46hrs)d1 q2w                          |
| 大腸がん(医師限定) | セツキシマブ(1週間間隔)+エンコラフェニブ               | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1+エンコラフェニブ(300mg/body)d1-7 q1w                                                                   |
| 大腸がん(医師限定) | セツキシマブ(1週間間隔)+エンコラフェニブ+ビニメチニブ        | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1+エンコラフェニブ(300mg/body)d1-7+ビニメチニブ(90mg/body)d1-7 q1w                                             |
| 大腸がん(医師限定) | セツキシマブ(2週間間隔)+エンコラフェニブ               | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+エンコラフェニブ(300mg/body)d1-14 q2w                                                                                 |
| 大腸がん(医師限定) | セツキシマブ(2週間間隔)+エンコラフェニブ+ビニメチニブ        | セツキシマブ(500mg/㎡)d1+エンコラフェニブ(300mg/body)d1-14+ビニメチニブ(90mg/body)d1-14 q2w                                                          |
| 胆道がん       | GC                                   | ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1、8+シスプラチン(25mg/㎡)d1、8 q3w                                                                                     |
| 胆道がん       | GC+デュルバルマブ                           | デュルバルマブ(1500mg/body)d1+ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1、8+シスプラチン(25mg/㎡)d1、8 q3w                                                              |
| 胆道がん       | GC+ベムプロリズマブ(3週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1、8+シスプラチン(25mg/㎡)d1、8 q3w                                                              |
| 胆道がん       | GC+ベムプロリズマブ(6週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1+ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1、8、22、29+シスプラチン(25mg/㎡)d1、8、22、29 q6w                                                  |
| 胆道がん       | GCS                                  | ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1+シスプラチン(25mg/㎡)d1+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-8朝 q2w                                                      |
| 胆道がん       | GEM                                  | ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1、8、15 q4w                                                                                                     |
| 胆道がん       | GEM+ベムプロリズマブ(3週間間隔)                  | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1、8 q3w                                                                                 |
| 胆道がん       | GEM+ベムプロリズマブ(6週間間隔)                  | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1+ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1、8、22、29 q6w                                                                           |
| 胆道がん       | GS                                   | ゲムシタピン(1000mg/㎡)d1、8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1タ-15朝 q3w                                                                    |
| 胆道がん       | デュルバルマブ(維持療法)                        | デュルバルマブ(1500mg/body)d1 q4w                                                                                                      |
| 唾液腺がん      | TC                                   | パクリタキセル(200mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                                                                            |
| 中枢神経胚細胞腫瘍  | CARE                                 | エトポシド(150mg/㎡)d1-3+カルボプラチン(450mg/㎡)d1 q4w                                                                                       |
| 中枢神経胚細胞腫瘍  | ICE                                  | シスプラチン(20mg/㎡)d1-5+エトポシド(60mg/㎡)d1-5+イホスファミド(900mg/㎡)d1-5 q4w                                                                   |
| 頭頸部がん      | CBDCa+5-FU+radiation(インフューザーポンプ使用)   | カルボプラチン(70mg/㎡)d1-4+フルオロウシル(2400mg/㎡)d1 q3w                                                                                     |
| 頭頸部がん      | CBDCa+5-FU+radiation(インフューザーポンプ不使用)  | カルボプラチン(70mg/㎡)d1-4+フルオロウシル(600mg/㎡)d1-4 q3w                                                                                    |
| 頭頸部がん      | CBDCa+5-FU+セツキシマブ(インフューザーポンプ使用)      | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1、8、15+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+フルオロウシル(4000mg/㎡)d1 q3w                                     |
| 頭頸部がん      | CBDCa+5-FU+セツキシマブ(インフューザーポンプ不使用)     | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1、8、15+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+フルオロウシル(1000mg/㎡)d1-4 q3w                                   |
| 頭頸部がん      | CBDCa+5-FU+ベムプロリズマブ(インフューザーポンプ使用)    | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+フルオロウシル(4000mg/㎡)d1 q3w                                                    |
| 頭頸部がん      | CBDCa+5-FU+ベムプロリズマブ(インフューザーポンプ不使用)   | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+フルオロウシル(1000mg/㎡)d1-4 q3w                                                  |
| 頭頸部がん      | CDDP+5-FU                            | フルオロウシル(750mg/㎡)d1-5+シスプラチン(60mg/㎡)d1 q3w                                                                                       |



| がん種    | レジメン名                             | レジメン内容(一般名)                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 頭頸部がん  | CDDP+5-FU+セツキシマブ(インフューザーポンプ使用)    | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1、8、15+シスプラチン(100mg/㎡)d1+フルオロウシル(4000mg/㎡)d1 q3w                                            |
| 頭頸部がん  | CDDP+5-FU+セツキシマブ(インフューザーポンプ不使用)   | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1、8、15+シスプラチン(100mg/㎡)d1+フルオロウシル(1000mg/㎡)d1-4 q3w                                          |
| 頭頸部がん  | CDDP+5-FU+ベムプロリズマブ(インフューザーポンプ使用)  | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+シスプラチン(100mg/㎡)d1+フルオロウシル(4000mg/㎡)d1 q3w                                                           |
| 頭頸部がん  | CDDP+5-FU+ベムプロリズマブ(インフューザーポンプ不使用) | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+シスプラチン(100mg/㎡)d1+フルオロウシル(1000mg/㎡)d1-4 q3w                                                         |
| 頭頸部がん  | CDDP+DOC+5-FU                     | シスプラチン(60mg/㎡)d1+ドセタキセル(60mg/㎡)d1+フルオロウシル(700mg/㎡)d1-4 q3w                                                                 |
| 頭頸部がん  | CDDP+radiation                    | シスプラチン(100mg/㎡)d1 q3w                                                                                                      |
| 頭頸部がん  | CDDP動注+radiation                  | シスプラチン(60mg/㎡)d1 q1w                                                                                                       |
| 頭頸部がん  | DOC                               | ドセタキセル(60mg/㎡)d1 q3w                                                                                                       |
| 頭頸部がん  | DOC+トラスツズマブ                       | トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg)d1+ドセタキセル(70mg/㎡)d1 q3w                                                                       |
| 頭頸部がん  | PCE 1コース目用                        | セツキシマブ(400mg/㎡)d1+パクリタキセル(80mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC1.5・MAX225mg/body)d1 q1w                                                    |
| 頭頸部がん  | PCE 2コース目以降用                      | セツキシマブ(250mg/㎡)d1+パクリタキセル(80mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC1.5・MAX225mg/body)d1 q1w                                                    |
| 頭頸部がん  | weeklyCDDP+radiation              | シスプラチン(40mg/㎡)d1 q1w                                                                                                       |
| 頭頸部がん  | weeklyDOC+radiation               | ドセタキセル(10mg/㎡)d1 q1w                                                                                                       |
| 頭頸部がん  | weeklyPAC+セツキシマブ                  | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1+パクリタキセル(80mg/㎡)d1 q1w                                                                     |
| 頭頸部がん  | セツキシマブ(Pt+5-FU+セツキシマブの7コース目以降用)   | セツキシマブ(250mg/㎡)d1 q1w                                                                                                      |
| 頭頸部がん  | セツキシマブ+radiation                  | セツキシマブ(初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡)d1 q1w                                                                                       |
| 頭頸部がん  | トラスツズマブ(DOC+トラスツズマブの7コース目以降)      | トラスツズマブ(6mg/kg)d1 q3w                                                                                                      |
| 頭頸部がん  | ニボルマブ(2週間間隔)                      | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                    |
| 頭頸部がん  | ニボルマブ(4週間間隔)                      | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                    |
| 頭頸部がん  | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                 |
| 頭頸部がん  | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                 |
| 乳がん    | AC                                | ドキシロピシリン(60mg/㎡)d1+シクロホスファミド(600mg/㎡)d1 q3w                                                                                |
| 乳がん    | AC+ベムプロリズマブ                       | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+ドキシロピシリン(60mg/㎡)d1+エンドキサン(600mg/㎡)d1 q3w                                                            |
| 乳がん    | CBDC+GEM+ベムプロリズマブ                 | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+GEM(1000mg/㎡)d1、8+カルボプラチン(AUC2・MAX300mg/body)d1、8 q3w                                               |
| 乳がん    | CBDC+PAC+ベムプロリズマブ                 | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+パクリタキセル(80mg/㎡)d1、8、15+カルボプラチン(AUC1.5・MAX225mg/body)d1、8、15 q3w                                     |
| 乳がん    | CPT-11(A法)                        | イリノテカン(100mg/㎡)d1、8、15 q4w                                                                                                 |
| 乳がん    | ddAC                              | ドキシロピシリン(60mg/㎡)d1+シクロホスファミド(600mg/㎡)d1 q2w                                                                                |
| 乳がん    | ddPAC                             | パクリタキセル(175mg/㎡)d1 q2w                                                                                                     |
| 乳がん    | DOC                               | ドセタキセル(75mg/㎡)d1 q3w                                                                                                       |
| 乳がん    | DOC+CPA                           | ドセタキセル(75mg/㎡)d1+シクロホスファミド(600mg/㎡)d1 q3w                                                                                  |
| 乳がん    | GEM                               | ゲムシタビン(1250mg/㎡)d1、8 q3w                                                                                                   |
| 乳がん    | HER+DOC+CPA                       | トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg)d1+ドセタキセル(75mg/㎡)d1+シクロホスファミド(600mg/㎡)d1 q3w                                                  |
| 乳がん    | HER+PER 1コース目用                    | トラスツズマブ(600mg/body)・ペルツズマブ(1200mg/body)d1 q3w                                                                              |
| 乳がん    | HER+PER 2コース目以降用                  | トラスツズマブ(600mg/body)・ペルツズマブ(600mg/body)d1 q3w                                                                               |
| 乳がん    | HER+PER+DOC 1コース目用                | トラスツズマブ(600mg/body)・ペルツズマブ(1200mg/body)d1+ドセタキセル(75mg/㎡)d1 q3w                                                             |
| 乳がん    | HER+PER+DOC 2コース目以降用              | トラスツズマブ(600mg/body)・ペルツズマブ(600mg/body)d1+ドセタキセル(75mg/㎡)d1 q3w                                                              |
| 乳がん    | nab-PAC                           | ナブパクリタキセル(260mg/㎡)d1 q3w                                                                                                   |
| 乳がん    | nab-PAC+アテゾリズマブ                   | アテゾリズマブ(840mg/body)d1、15+ナブパクリタキセル(100mg/㎡)d1、8、15 q4w                                                                     |
| 乳がん    | nab-PAC+ベムプロリズマブ                  | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1、22、43、64+ナブパクリタキセル(100mg/㎡)d1、8、15、29、36、43、57、64、71 q12w                                           |
| 乳がん    | PAC(A法)                           | パクリタキセル(210mg/㎡)d1 q3w                                                                                                     |
| 乳がん    | PAC(B法)                           | パクリタキセル(100mg/㎡)d1、8、15、22、29、36 q7w                                                                                       |
| 乳がん    | PAC+BV                            | パクリタキセル(90mg/㎡)d1、8、15+ベムシズマブ(10mg/kg)d1、15 q4w                                                                            |
| 乳がん    | PAC+ベムプロリズマブ                      | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1、22、43、64+パクリタキセル(90mg/㎡)d1、8、15、29、36、43、57、64、71 q12w                                              |
| 乳がん    | T-DM1                             | トラスツズマブ エムタンシン(3.6mg/kg)d1 q3w                                                                                             |
| 乳がん    | VNR                               | ビレレピン(25mg/㎡)d1、8 q3w                                                                                                      |
| 乳がん    | weeklyPAC                         | パクリタキセル(80mg/㎡)d1、8、15 q4w                                                                                                 |
| 乳がん    | エリブリン                             | エリブリン(1.4mg/㎡)d1、8 q3w                                                                                                     |
| 乳がん    | カベジタシン+トラスツズマブ                    | カベジタシン(内服)d1タ-15朝+トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg)d1 q3w                                                                      |
| 乳がん    | クラシカルCMF                          | メトトレキサート(40mg/㎡)d1、8+フルオロウシル(600mg/㎡)d1、8+シクロホスファミド(内服100mg/㎡)d1-14 q4w                                                    |
| 乳がん    | サシツズマブ ユビテカン                      | サシツズマブ ユビテカン(10mg/kg)d1、8 q3w                                                                                              |
| 乳がん    | ダトボタマブ デルクステカン                    | ダトボタマブ デルクステカン(6mg/kg)d1 q3w                                                                                               |
| 乳がん    | トラスツズマブ(triweekly)                | トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg)d1 q3w                                                                                        |
| 乳がん    | トラスツズマブ(triweekly)+PAC            | トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg)d1+パクリタキセル(80mg/㎡)d1、8、15 q3w                                                                 |
| 乳がん    | トラスツズマブ(weekly)                   | トラスツズマブ(初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg)d1 q1w                                                                                        |
| 乳がん    | トラスツズマブ(weekly)+PAC               | トラスツズマブ(初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg)d1+パクリタキセル(80mg/㎡)d1 q1w                                                                      |
| 乳がん    | トラスツズマブ+DOC                       | トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg)d1+ドセタキセル(75mg/㎡)d1 q3w                                                                       |
| 乳がん    | トラスツズマブ+エリブリン                     | トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg)d1+エリブリン(1.4mg/㎡)d1、8 q3w                                                                     |
| 乳がん    | トラスツズマブデルクステカン                    | トラスツズマブデルクステカン(5.4mg/kg)d1 q3w                                                                                             |
| 乳がん    | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                 |
| 乳がん    | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                 |
| 尿路上皮がん | GC 外来用                            | ゲムシタビン(1000mg/㎡)d1、8、15+シスプラチン(70mg/㎡)d2 q4w                                                                               |
| 尿路上皮がん | GC 入院用                            | ゲムシタビン(1000mg/㎡)d1、8、15+シスプラチン(70mg/㎡)d2 q4w                                                                               |
| 尿路上皮がん | GC+ニボルマブ                          | ニボルマブ(360mg/body)d1+ゲムシタビン(1000mg/㎡)d1、8+シスプラチン(70mg/㎡)d1 q3w                                                              |
| 尿路上皮がん | G-Carbo                           | ゲムシタビン(1000mg/㎡)d1、8+カルボプラチン(AUC4.5・MAX675mg/body)d1 q3w                                                                   |
| 尿路上皮がん | G-Carbo+ニボルマブ                     | ニボルマブ(360mg/body)d1+ゲムシタビン(1000mg/㎡)d1、8+カルボプラチン(AUC4.5orAUC5・MAX750mg/body)d1 q3w                                         |
| 尿路上皮がん | GP                                | ゲムシタビン(2500mg/㎡)d1+パクリタキセル(150mg/㎡)d1 q2w                                                                                  |
| 尿路上皮がん | M-VAC                             | メトトレキサート(30mg/㎡)d1、15、22+ビンブラスチン(3mg/㎡)d2、15、22+ドキシロピシリン(30mg/㎡)d2+シスプラチン(70mg/㎡)d2 q4w                                    |
| 尿路上皮がん | weeklyCBDC+PAC                    | パクリタキセル(80mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC2・MAX300mg/body)d1 q1w                                                                        |
| 尿路上皮がん | アベルマブ                             | アベルマブ(10mg/kg)d1 q2w                                                                                                       |
| 尿路上皮がん | エンホルツマブ ベドチン                      | エンホルツマブ ベドチン(1.25mg/kg・MAX125mg/body)d1、8、15 q4w                                                                           |
| 尿路上皮がん | ニボルマブ(2週間間隔)                      | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                    |
| 尿路上皮がん | ニボルマブ(4週間間隔)                      | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                    |
| 尿路上皮がん | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                 |
| 尿路上皮がん | ベムプロリズマブ(3週間間隔)+エンホルツマブ ベドチン      | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+エンホルツマブ ベドチン(1.25mg/kg・MAX125mg/body)d1、8 q3w                                                       |
| 尿路上皮がん | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                   | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                 |
| 尿路上皮がん | ベムプロリズマブ(6週間間隔)+エンホルツマブ ベドチン      | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1+エンホルツマブ ベドチン(1.25mg/kg・MAX125mg/body)d1、8、22、29 q6w                                                 |
| 脳腫瘍    | BV(再発)                            | ベバシズマブ(10mg/kg)d1 q2w                                                                                                      |
| 脳腫瘍    | BV(初発単剤療法期)                       | ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                                                                      |
| 脳腫瘍    | BV+TMZ(1TMZ内服)(初発維持療法期)           | ベバシズマブ(10mg/kg)d1、15+テモゾロミド(150mg/㎡ or 200mg/㎡)d1-5 q4w                                                                    |
| 脳腫瘍    | BV+TMZ(初発維持療法期)                   | ベバシズマブ(10mg/kg)d1、15+テモゾロミド(150mg/㎡ or 200mg/㎡)d1-5 q4w                                                                    |
| 脳腫瘍    | BV+TMZ+RT(TMZ内服)(初発放射線併用期)        | ベバシズマブ(10mg/kg)d1、15、29、42+テモゾロミド(内服75mg/㎡)d1-42 q10w                                                                      |
| 脳腫瘍    | BV+TMZ+RT(初発放射線併用期)               | ベバシズマブ(10mg/kg)d1、15、29、42+テモゾロミド(75mg/㎡)d1-42 q10w                                                                        |
| 脳腫瘍    | MONU                              | ラニムスチン(80mg/㎡)d1 q6w                                                                                                       |
| 脳腫瘍    | PAV                               | ニムスチン(70mg/㎡)d1+ビンクリスチン(1.4mg/㎡・MAX2mg/body)d8、29+プロカルバジン(100mg/body)d8-21 q8w                                             |
| 脳腫瘍    | TMZ(初発維持療法期・再発)                   | テモゾロミド(150mg/㎡ or 200mg/㎡)d1-5 q4w                                                                                         |
| 脳腫瘍    | TMZ+RT(初発放射線併用期)                  | テモゾロミド(75mg/㎡)d1-42 q10w                                                                                                   |
| 肺がん    | CBDC+nab-PAC+アテゾリズマブ              | アテゾリズマブ(1200mg/body)d1+ナブパクリタキセル(100mg/㎡)d1、8、15+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                                         |
| 肺がん    | CBDC+Pem+オシメルチニブ                  | ペトレキセド(500mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+オシメルチニブ(80mg/body)d1-21 q3w                                                |
| 肺がん    | CDDP+Pem+オシメルチニブ                  | ペトレキセド(500mg/㎡)d1+シスプラチン(75mg/㎡)d1+オシメルチニブ(80mg/body)d1-21 q3w                                                             |
| 肺がん    | Pem+オシメルチニブ(維持療法)                 | ペトレキセド(500mg/㎡)d1+オシメルチニブ(80mg/body)d1-21 q3w                                                                              |
| 肺がん    | AMR                               | アムルピジン(40mg/㎡)d1-3 q3~4w                                                                                                   |
| 肺がん    | BV(維持療法)                          | ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                                                                      |
| 肺がん    | CBDC+CP1-11                       | イリノテカン(60mg/㎡)d1、8、15+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q4w                                                                    |
| 肺がん    | CBDC+DOC                          | ドセタキセル(70mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3w                                                                         |
| 肺がん    | CBDC+GEM                          | ゲムシタビン(1000mg/㎡)d1、8+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3w                                                                     |
| 肺がん    | CBDC+GEM+デュルバルマブ+トレメリムマブ          | トレメリムマブ(75mg/body)d1+デュルバルマブ(1500mg/body)d1+ゲムシタビン(1000mg/㎡)d1、8+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                   |
| 肺がん    | CBDC+GEM+ニボルマブ                    | ニボルマブ(360mg/body)d1+ゲムシタビン(1000mg/㎡)d1、8+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                                           |
| 肺がん    | CBDC+nab-PAC                      | ナブパクリタキセル(100mg/㎡)d1、8、15+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                                                                |
| 肺がん    | CBDC+nab-PAC+デュルバルマブ+トレメリムマブ      | トレメリムマブ(75mg/body)d1+デュルバルマブ(1500mg/body)d1+ナブパクリタキセル(100mg/㎡)d1、8、15+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body)d1 q3w              |
| 肺がん    | CBDC+nab-PAC+ベムプロリズマブ             | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+ナブパクリタキセル(100mg/㎡)d1、8、15+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                                         |
| 肺がん    | CBDC+PAC                          | パクリタキセル(200mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                                                                       |
| 肺がん    | CBDC+PAC+BV                       | パクリタキセル(200mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1+ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                     |
| 肺がん    | CBDC+PAC+BV+アテゾリズマブ               | アテゾリズマブ(1200mg/body)d1+ベバシズマブ(15mg/kg)d1+パクリタキセル(200mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                              |
| 肺がん    | CBDC+PAC+ニボルマブ                    | ニボルマブ(360mg/body)d1+パクリタキセル(200mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                                             |
| 肺がん    | CBDC+PAC+ベムプロリズマブ                 | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+パクリタキセル(200mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                                                |
| 肺がん    | CBDC+Pem+BV                       | ベバシズマブ(15mg/kg)d1+ペトレキセド(500mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                                                      |
| 肺がん    | CBDC+Pem+アミバンタマブ 1コース目用 80kg以上    | アミバンタマブ(350mg/body)d1+アミバンタマブ(1400mg/body)d2+アミバンタマブ(1750mg/body)d8、15+ペトレキセド(500mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3w |
| 肺がん    | CBDC+Pem+アミバンタマブ 1コース目用 80kg未満    | アミバンタマブ(350mg/body)d1+アミバンタマブ(1050mg/body)d2+アミバンタマブ(1400mg/body)d8、15+ペトレキセド(500mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3w |
| 肺がん    | CBDC+Pem+アミバンタマブ 2コース目用 80kg以上    | アミバンタマブ(1750mg/body)d1+ペトレキセド(500mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3w                                                 |
| 肺がん    | CBDC+Pem+アミバンタマブ 2コース目用 80kg未満    | アミバンタマブ(1400mg/body)d1+ペトレキセド(500mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3w                                                 |

| がん種           | レジメン名                                             | レジメン内容(一般名)                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 肺がん           | CBDCA+Pem+アミバンタマブ 3コース目・4コース目<br>用 80kg未満         | アミバンタマブ(1750mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3w                                 |
| 肺がん           | CBDCA+Pem+アミバンタマブ 3コース目・4コース目<br>用 80kg以上         | アミバンタマブ(2100mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3w                                 |
| 肺がん           | CBDCA+Pem+デュルバルマブ+トレミムマブ                          | トレミムマブ(75mg/body)d1+デュルバルマブ(1500mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body)d1 q3w       |
| 肺がん           | CBDCA+Pem+ニボルマブ                                   | ニボルマブ(360mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                              |
| 肺がん           | CBDCA+S1                                          | カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+S1(内服)d1-14 q3w                                                                             |
| 肺がん           | CBDCA+VNR                                         | ビレレピン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3w                                                        |
| 肺がん           | CBDCA+VP-16                                       | エトボシド(80mg/m <sup>2</sup> or100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3~4w                                |
| 肺がん           | CBDCA+VP-16+RTx                                   | エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3~4w                                                      |
| 肺がん           | CBDCA+VP-16+アテゾリズマブ                               | アテゾリズマブ(1200mg/body)d1+エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3w                                 |
| 肺がん           | CBDCA+VP-16+デュルバルマブ                               | デュルバルマブ(1500mg/body)d1+エトボシド(80mg/m <sup>2</sup> or100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+カルボプラチン(AUC5)d1 q3w                         |
| 肺がん           | CDDP+OPT-11                                       | イリノテカン(60mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q4w                                                  |
| 肺がん           | CDDP+OPT-11(short hydration)                      | イリノテカン(60mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q4w                                                  |
| 肺がん           | CDDP+DOC                                          | ドセタキセル(70mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                         |
| 肺がん           | CDDP+DOC(short hydration)                         | ドセタキセル(70mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                         |
| 肺がん           | CDDP+DOC+RTx(short hydration)                     | ドセタキセル(40mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(40mg/m <sup>2</sup> )d1, 8 q4w                                                   |
| 肺がん           | CDDP+GEM                                          | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                    |
| 肺がん           | CDDP+GEM(short hydration)                         | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                    |
| 肺がん           | CDDP+GEM+BV                                       | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1+ベパシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                  |
| 肺がん           | CDDP+GEM+BV (short hydration)                     | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1+ベパシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                  |
| 肺がん           | CDDP+GEM+デュルバルマブ+トレミムマブ                           | トレミムマブ(75mg/body)d1+デュルバルマブ(1500mg/body)d1+ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w         |
| 肺がん           | CDDP+GEM+ニボルマブ                                    | ニボルマブ(360mg/body)d1+ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                |
| 肺がん           | CDDP+Pem+BV(short hydration)                      | ベパシズマブ(15mg/kg)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                     |
| 肺がん           | CDDP+Pem+デュルバルマブ+トレミムマブ                           | トレミムマブ(75mg/body)d1+デュルバルマブ(1500mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w            |
| 肺がん           | CDDP+Pem+ニボルマブ                                    | ニボルマブ(360mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                   |
| 肺がん           | CDDP+S1                                           | シスプラチン(60mg/m <sup>2</sup> )d8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1-21 q4~5w                                                    |
| 肺がん           | CDDP+S1(short hydration)                          | シスプラチン(60mg/m <sup>2</sup> )d8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1-21 q4~5w                                                    |
| 肺がん           | CDDP+VNR                                          | ビレレピン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                       |
| 肺がん           | CDDP+VNR(CDDP分割)                                  | ビレレピン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(40mg/m <sup>2</sup> )d1, 8 q3w                                                    |
| 肺がん           | CDDP+VNR(short hydration)                         | ビレレピン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                       |
| 肺がん           | CDDP+VP-16                                        | エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3~4w                                                     |
| 肺がん           | CDDP+VP-16(short hydration)                       | エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3~4w                                                     |
| 肺がん           | CDDP+VP-16+RTx                                    | エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+シスプラチン(80mg/m <sup>2</sup> )d1 q3~4w                                                     |
| 肺がん           | CDDP+VP-16+デュルバルマブ                                | デュルバルマブ(1500mg/body)d1+エトボシド(80mg/m <sup>2</sup> or100mg/m <sup>2</sup> )d1-3+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body)d1 q3w     |
| 肺がん           | OPT-11                                            | イリノテカン(100mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                |
| 肺がん           | OPT-11+S1                                         | イリノテカン(80mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+S1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)(内服)d1-14 q3~4w                                                 |
| 肺がん           | DOC                                               | ドセタキセル(70mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                                                        |
| 肺がん           | GEM                                               | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                               |
| 肺がん           | GEM+VNR                                           | ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )d1, 8+ビレレピン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 8 q3w                                                  |
| 肺がん           | nab-PAC                                           | ナパブリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q3w                                                                              |
| 肺がん           | NGT                                               | ノキテカン(1mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q3w                                                                                        |
| 肺がん           | NGT+PAC                                           | ノキテカン(1.75mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+ナブリタキセル(70mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                         |
| 肺がん           | Pem+BV(維持療法)                                      | ベパシズマブ(15mg/kg)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                                    |
| 肺がん           | Pem+アミバンタマブ CBDCA+Pem+アミバンタマブ5コース目以降用 80kg以上      | アミバンタマブ(2100mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                               |
| 肺がん           | Pem+アミバンタマブ CBDCA+Pem+アミバンタマブ5コース目以降用 80kg未満      | アミバンタマブ(1750mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                               |
| 肺がん           | Pem+デュルバルマブ(維持療法)                                 | デュルバルマブ(1500mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1 q4w                                                               |
| 肺がん           | Pem+デュルバルマブ+トレミムマブ (Durva+Treme+Pt+Pemの5, 6コース目用) | トレミムマブ(75mg/body)d29+デュルバルマブ(1500mg/body)d1, 29+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1, 29 q8w                                  |
| 肺がん           | Pem+ベムプロリズマブ(維持療法)                                | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                               |
| 肺がん           | RAM+DOC                                           | ラムシルマブ(10mg/kg)d1+ドセタキセル(60mg/m <sup>2</sup> or75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                |
| 肺がん           | SPE                                               | エトボシド(80mg/m <sup>2</sup> )d1-3+シスプラチン(25mg/m <sup>2</sup> )d1-3 q3~4w                                                    |
| 肺がん           | VNR                                               | ビレレピン(25mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                  |
| 肺がん           | weeklyTC+RTx                                      | パクリタキセル(40mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC2・MAX300mg/body)d1 q1w                                                         |
| 肺がん           | アテゾリズマブ                                           | アテゾリズマブ(1200mg/body)d1 q3w                                                                                                |
| 肺がん           | アテゾリズマブ                                           | アテゾリズマブ(1200mg/body)d1 q3w                                                                                                |
| 肺がん           | アテゾリズマブ+BV(維持療法)                                  | アテゾリズマブ(1200mg/body)d1+ベパシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                                              |
| 肺がん           | アミバンタマブ+ラゼルチニブ 1コース目用 80kg未満                      | アミバンタマブ(350mg/body)d1+アミバンタマブ(700mg/body)d2+アミバンタマブ(1050mg/body)d8, 15, 22+ラゼルチニブ(240mg/body)d1-28 q4w                    |
| 肺がん           | アミバンタマブ+ラゼルチニブ 1コース目用 80kg以上                      | アミバンタマブ(350mg/body)d1+アミバンタマブ(1050mg/body)d2+アミバンタマブ(1400mg/body)d8, 15, 22+ラゼルチニブ(240mg/body)d1-28 q4w                   |
| 肺がん           | アミバンタマブ+ラゼルチニブ 2コース目以降用 80kg未満                    | アミバンタマブ(1050mg/body)d1+ラゼルチニブ(240mg/body)d1-14 q2w                                                                        |
| 肺がん           | アミバンタマブ+ラゼルチニブ 2コース目以降用 80kg以上                    | アミバンタマブ(1400mg/body)d1+ラゼルチニブ(240mg/body)d1-14 q2w                                                                        |
| 肺がん           | エルロチニブ+BV                                         | ベパシズマブ(15mg/kg)d1+エルロチニブ(150mg/body)d1-21 q3w                                                                             |
| 肺がん           | エルロチニブ+RAM                                        | ラムシルマブ(10mg/kg)d1+エルロチニブ(150mg/body)d1-14 q2w                                                                             |
| 肺がん           | ゲフィチニブ+BV                                         | ベパシズマブ(15mg/kg)d1+ゲフィチニブ(250mg/body)d1-21 q3w                                                                             |
| 肺がん           | ゲフィチニブ+RAM                                        | ラムシルマブ(10mg/kg)d1+ゲフィチニブ(250mg/body)d1-14 q2w                                                                             |
| 肺がん           | タラタマブ 1コース目用                                      | タラタマブ(1mg/body)d1+タラタマブ(10mg/body)d8, 15 q4w                                                                              |
| 肺がん           | タラタマブ 2コース目以降用                                    | タラタマブ(10mg/body)d1 q2w                                                                                                    |
| 肺がん           | デュルバルマブ(維持療法)                                     | デュルバルマブ(1500mg/body)d1 q4w                                                                                                |
| 肺がん           | デュルバルマブ+トレミムマブ (Durva+Treme+Pt+Chemoの5, 6コース目用)   | トレミムマブ(75mg/body)d29+デュルバルマブ(1500mg/body)d1, 29 q8w                                                                       |
| 肺がん(非扁平上皮がん)  | CBDCA+Pem+ニボルマブ+イビリムマブ                            | ニボルマブ(360mg/body)d1, 22+イビリムマブ(1mg/kg)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1, 22+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body)d1, 22 q6w |
| 肺がん(非扁平上皮がん)  | CDDP+Pem+ニボルマブ+イビリムマブ                             | ニボルマブ(360mg/body)d1, 22+イビリムマブ(1mg/kg)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1, 22+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1, 22 q6w      |
| 肺がん(扁平上皮がん)   | CBDCA+PAC+ニボルマブ+イビリムマブ                            | ニボルマブ(360mg/body)d1, 22+イビリムマブ(1mg/kg)d1+ナブリタキセル(200mg/m <sup>2</sup> )d1, 22+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1, 22 q6w       |
| 肺がん・悪性胸腺中皮腫   | CBDCA+Pem                                         | ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                                                  |
| 肺がん・悪性胸腺中皮腫   | CBDCA+Pem+ベムプロリズマブ                                | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+カルボプラチン(AUC5orAUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                           |
| 肺がん・悪性胸腺中皮腫   | CDDP+Pem                                          | ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                       |
| 肺がん・悪性胸腺中皮腫   | CDDP+Pem+ベムプロリズマブ                                 | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1+ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1+シスプラチン(75mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                |
| 肺がん・悪性胸腺中皮腫   | Pem                                               | ベメトレキセド(500mg/m <sup>2</sup> )d1 q3w                                                                                      |
| 肺がん・悪性胸腺中皮腫   | ニボルマブ(2週間間隔)                                      | ニボルマブ(240mg/body)d1 q2w                                                                                                   |
| 肺がん・悪性胸腺中皮腫   | ニボルマブ(2週間間隔)+イビリムマブ                               | ニボルマブ(240mg/body)d1, 15, 29+イビリムマブ(1mg/kg)d1 q6w                                                                          |
| 肺がん・悪性胸腺中皮腫   | ニボルマブ(3週間間隔)+イビリムマブ                               | ニボルマブ(360mg/body)d1, 22+イビリムマブ(1mg/kg)d1 q6w                                                                              |
| 肺がん・悪性胸腺中皮腫   | ニボルマブ(4週間間隔)                                      | ニボルマブ(480mg/body)d1 q4w                                                                                                   |
| 肺がん・悪性胸腺中皮腫   | ベムプロリズマブ(3週間間隔)                                   | ベムプロリズマブ(200mg/body)d1 q3w                                                                                                |
| 肺がん・悪性胸腺中皮腫   | ベムプロリズマブ(6週間間隔)                                   | ベムプロリズマブ(400mg/body)d1 q6w                                                                                                |
| 皮膚がん          | PEP                                               | ペフロマイシン(10mg/body)d1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29, 32 q5w                                                                |
| 副腎がん          | EDP-M                                             | ドキシゾリン(40mg/m <sup>2</sup> )d1+エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d2-4+シスプラチン(40mg/m <sup>2</sup> )d2, 3+ミトタン(内服)d1-28 q4w       |
| 膀胱がん          | BCG40mg膀胱内注入                                      | BCG(40mg/body)d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 q8w                                                                           |
| 膀胱がん          | BCG40mg膀胱内注入 単回用                                  | BCG(40mg/body)d1 q1w                                                                                                      |
| 膀胱がん          | BCG80mg膀胱内注入                                      | BCG(80mg/body)d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 q8w                                                                           |
| 膀胱がん          | MMC膀胱内注入                                          | マイトマイシンC(30mg/body)d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64 q10w                                                             |
| 膀胱がん          | THP膀胱内注入                                          | ピラルビシン(30mg/body)d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64 q10w                                                               |
| 膀胱がん          | THP膀胱内注入 OPE用                                     | ピラルビシン(30mg/body)d1 q1w                                                                                                   |
| 慢性白血病         | FCR(1コース目)                                        | リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1+シクロホスファミド(250mg/m <sup>2</sup> )d2-4+フルダリン(25mg/m <sup>2</sup> )d2-4 q4w                  |
| 慢性白血病         | FCR(2コース目以降)                                      | リツキシマブ(500mg/m <sup>2</sup> )d1+シクロホスファミド(250mg/m <sup>2</sup> )d2-4+フルダリン(25mg/m <sup>2</sup> )d2-4 q4w                  |
| 慢性白血病         | RCD                                               | リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> )d1+シクロホスファミド(750mg/m <sup>2</sup> )d2+デキサメタゾン(点滴静注9.9mg/bodyor内服12mg/body)d1-7 q4w           |
| ユーイング肉腫       | IE                                                | エトボシド(100mg/m <sup>2</sup> )d1-5+シクロホスファミド(1800mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q2w                                                |
| ユーイング肉腫       | VDC                                               | ビンクリスチン(2.0mg/m <sup>2</sup> ・MAX2mg/body)d1+シクロホスファミド(1200mg/m <sup>2</sup> )d1+ドキシゾリン(37.5mg/m <sup>2</sup> )d1, 2 q2w  |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | VBL+PSL(LCH Group3 維持療法)                          | ビンブラスチン(6mg/m <sup>2</sup> )d1+ブレデニソロン(40mg/m <sup>2</sup> )d1-5 q3w                                                      |
| 卵巣がん          | BV(維持療法)                                          | ベパシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                                                                                     |
| 卵巣がん          | OPT-11(A法)                                        | イリノテカン(100mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15 q4w                                                                                |
| 卵巣がん          | CPT-P                                             | イリノテカン(60mg/m <sup>2</sup> )d1, 8, 15+シスプラチン(60mg/m <sup>2</sup> )d1 q4w                                                  |

| がん種     | レジメン名        | レジメン内容(一般名)                                                                       |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 卵巣がん    | DC           | ドセタキセル(70mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q3～4w                              |
| 卵巣がん    | dose-denseTC | パクリタキセル(80mg/㎡)d1、8、15+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3～4w                        |
| 卵巣がん    | GEM          | ゲムシタビン(1000mg/㎡)d1、8、15 q4w                                                       |
| 卵巣がん    | GEM+BV       | ゲムシタビン(1000mg/㎡)d1、8+ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                        |
| 卵巣がん    | GEM+CBDCA    | ゲムシタビン(1000mg/㎡)d1、8+カルボプラチン(AUC4・MAX600mg/body)d1 q3w                            |
| 卵巣がん    | NGT          | ノギテカン(1.5mg/㎡)d1-5 q3w                                                            |
| 卵巣がん    | NGT+BV       | ノギテカン(1.25mg/㎡)d1-5+ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                                         |
| 卵巣がん    | PLD          | ドキシソルピシン塩酸塩リボソーム(40mg/㎡)d1 q4w                                                    |
| 卵巣がん    | PLD+BV       | ドキシソルピシン塩酸塩リボソーム(40mg/㎡)d1+ベバシズマブ(10mg/kg)d1、15 q4w                               |
| 卵巣がん    | PLD+CBDCA    | ドキシソルピシン塩酸塩リボソーム(30mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1 q4w                      |
| 卵巣がん    | PLD+CBDCA+BV | ドキシソルピシン塩酸塩リボソーム(30mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC5・MAX750mg/body)d1+ベバシズマブ(10mg/kg)d1、15 q4w |
| 卵巣がん    | TC           | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1 q3w                              |
| 卵巣がん    | TC+BV        | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC6・MAX900mg/body)d1+ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w            |
| 卵巣がん    | TP           | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+シスプラチン(75mg/㎡)d1 q3w                                           |
| 卵巣がん    | TP+BV        | パクリタキセル(175mg/㎡)d1+シスプラチン(75mg/㎡)d1+ベバシズマブ(15mg/kg)d1 q3w                         |
| 卵巣がん    | weeklyPAC    | パクリタキセル(80mg/㎡)d1、8、15 q4w                                                        |
| 卵巣がん    | weeklyTC     | パクリタキセル(60mg/㎡)d1+カルボプラチン(AUC2・MAX300mg/body)d1 q1w                               |
| 卵巣胚細胞腫瘍 | BEP          | ブレオマイシン(30mg/body)d2、9、16+エトポシド(100mg/㎡)d1-5+シスプラチン(20mg/㎡)d1-5 q3w               |
| 卵巣胚細胞腫瘍 | TIP          | パクリタキセル(210mg/㎡)d1+イホスファミド(1200mg/㎡)d2-6+シスプラチン(20mg/㎡)d2-6 q3w                   |